

仔豬開始不會吃時，要用手指頭把教槽飼料抹入仔豬的嘴裏，因為教槽飼料中含有砂糖百分之五，比豬乳美味可口，經過一次嚐試，吃後就會學氈，一窩仔豬中，只要有一頭會氈食，其餘會跟着學氈。但是要注意頭兩天，不要餓得過飽。

從一號飼料，改換成二號飼料時，要漸漸的增加，第一天在一號飼料中，混入二號飼料三分之一，第二天各半，第三天三分之二，總之要慢慢改變，以免發生消化不良或下痢。

## 教糟飼料好處很多

母猪授乳中，如果突然發生疾病，不能繼續授乳，或乳量不足，乳質不好的，仔猪發育很慢或是發生嚴重白痢症的，都可提早離乳，換用教槽飼料。凡用教槽飼料育成的仔猪，消化器官比較發達，消化力強，離乳後健康活潑。

本文作者做過用教槽飼料餵仔豬的試驗，有一組仔豬在三週令時離乳，即用教槽飼料，另一組不用教槽飼料，在它出生後四十天，餵給普通的仔豬飼料，作為對照。

且以後也便屬清潔，營養豐富。

依照現在的仔豬價格，每公斤廿五元計算，每頭平均增收十三元二角二分。而且採用教槽飼料，提早離乳後的母豬，平均每頭產後三十一天便發情配種而受胎，比了普通不用教槽平均要隔五十六天才發情的母豬，提早了二十五天，也就是說，可以節省二十五天份的種母豬飼料和勞力。這二十五天份的種母豬飼料費，至少又可節省了二百元。

# 豬的萎縮性鼻炎

本文作者最近在臺糖種畜場病理研究室，見到了幾種可疑的猪萎縮性鼻炎的病理標本，因此認為這種病，可能在本省其他地區也有傳播，爲了提醒一般獸醫人員的注意，特別把這種病的病狀和防治法介紹如下：

病猪

**病豬都打噴嚏** 產後三星期左右的小豬，或是發育中的中豬，常會發生萎縮性鼻炎，病豬經常不停的打噴嚏，隨後病情漸漸增加，所流鼻涕，常常黏質，有時並帶血絲，鼻孔內的骨骼常發生彎曲。並且會發生如肺炎，因而使面骨變形彎曲。

、下痢和精神萎頓等併發症，這種病豬大都發育不良，或有跛行的病狀。

如果解剖病豬的結果，鼻腭骨骼部份，會發現有相當程度的變形，一般多以鼻中隔和鼻甲介骨處變形最明顯。鼻腔內壁膜的表面，常有多餘的粘液存在。



用土

**用土** 在防治的原則上，以衛生設備和適當的管理最爲重要。凡患病的小貓不宜供留種繁殖。當萎縮性鼻炎蔓延到畜羣時，採用土黴素（

## 防治

炎點

趙法清



吃魚吃青  
肉食平營子  
無均養日  
外有  
好效高吃  
(好不)果  
(許少)薄淡

，（好最）好界上動活體團  
，迅逗小年少和去  
，做己自力活命生  
。寶是就金健理心

，學（可不）通喚酒飲（博賭）縱拔  
，餓（太）箱或飽（太）箱通喚居起  
，  
，（量）適）好門着食飲  
。錯無允起早調半