



怎樣栽培第一等品質 最高產量的

洋葱、馬鈴薯、蕃茄、西瓜、山東白菜、甘藍菜？

利用「萬生MANZATE®」殺菌劑 是最正確可靠的方法！！

「萬生MANZATE®」殺菌劑為聞名世界的美國杜邦公司所出品。含有主成份 MANEB 80%之可濕性粉劑。與水調合成噴霧液，使用於防治多種作物之病害。「萬生對作物有特別優良的附着性安全性和殺菌效力；尤其對於多種蔬菜、果樹、花卉病害之病原菌有特殊的功效。

※**洋葱**：於最初發現病斑時即開始噴藥；以後視需要情形每週噴藥一次，以防治洋葱露菌病，紫斑病葉枯病，銹病。藥液濃度400至500倍。

※**馬鈴薯**：作物生長到2至6吋高時即施藥；每公頃使用「萬生」2—5磅藥液濃度400—600倍，並注意將作物充份噴射週到。病害威脅時每隔5—10日施藥一次，以防早疫病及晚疫病之發生。如病害猖獗時可縮短間隔時間或增加藥量。

※**蕃茄**：當作物結實（結球）時即開始噴藥，以後每7至10日噴藥一次，以防治蕃茄早疫病，晚疫病，葉斑病，葉霉病，炭疽病。如病害較早發生時，即在作物定植後即可開始繼續噴藥。藥液濃度400—500倍，並注意將作物全株充份噴射週到。

※**山東白菜、小白菜、甘藍菜**：使用藥液濃度500倍每公頃使用「萬生」4—6磅，以防治露菌病，及黑斑病。在苗圃或直播作物，於播種後7—10日或病害發現時開始噴藥，以後每3日施藥一次。作物定植後，病害發現時開始噴藥，以後視需要情形每週噴藥一次；如病害嚴重時則3—5日噴藥一次。

※**西瓜**：使用藥液濃度400—500倍，以防治西瓜露菌病、蔓枯病、葉斑病、炭疽病。蔓藤開始生長或病害威脅時則施藥。每隔7—10日施藥一次；如病害猖獗時則3—5日施藥一次。

※**大豆**：在播種後50天左右，發現病斑開始出現時，以「萬生」400倍稀釋液則第一次噴藥，以防治紫斑病、銹病、炭疽病及露菌病；以後每隔10天噴射一次，至收穫前半個月止。每公頃每次使用「萬生」4—6磅。

※其他對於各種豆類、瓜類、芹菜、菠菜、紅蘿蔔、高苜及菸草、花卉等諸病害之防治，亦以藥液濃度400—600倍，每公頃使用「萬生」3—6磅，即可獲得最佳效果。

包裝：每包3磅，每箱16包（美國原裝）。



REG.U.S. PAT. OFF

美國杜邦公司工、農藥部

臺灣總代理：合裕貿易股份有限公司

地址：臺北市中正路一一九九號

電話：四八九一三

敬啓者

年 月 日

1, 我擬購「萬生 MANZATE®」殺菌劑 箱 (每箱16包共48磅) 包 (每包3磅) 請報價。

2, 請寄下說明書：「依必安」殺蟲劑 「卡滅克斯」除草劑
「萬生」殺菌劑 「谷樂生」種子消毒劑

我是 農友, 經營農場, 農業指導人員, 農藥零售商。

姓名：

請填明數量

住址：

請填✓記號

行號或服務處：