

# 菸草蛉夜盜斜紋

## 盜夜紋斜

珍玉張

### 怎樣識別？

### 怎樣防治？

(一) 幼蟲：體色變化很大，有綠、橙紅、黃褐及深褐等色，少數個體具有瘤狀突起，或有不大明的白色縱紋及黑色背線。

(二) 成蟲：橙黃色，前翅無灰白色粗大斜帶。

(三) 幼蟲生活習性及爲害狀況：

本省的菸害蟲中，以菸齡蛉和斜紋夜盜的幼蟲爲害時期最長（整個菸期），發生地區也最廣泛（遍及全省菸田），所以，可以說是最主要的菸害蟲。因爲這二種蟲都是昆蟲綱中的鱗翅目夜蛾科，幼蟲個體都略帶綠色，所以，農們都統稱它們爲青蟲。可是事實上，它們在成蟲、卵、幼蟲及蛹的形態上都不相同，生活習性爲害狀況也有差異。

### 怎樣識別？

這裏特地將它們的不同點列出，以助識別及作有效的防治。

### 菸草蛉

### 怎樣防治？

(一) 藥劑防治：經試驗結果，下列各種農藥，對該二種害蟲均有效，但防治菸草齡蛉幼蟲應法意施藥於莖部嫩葉，防治斜紋夜盜幼蟲則應注意施藥於葉背上。

① 一〇% DDT 粉劑，最宜於苗床期及本圃初期施用。

蟲。  
(二) 別名：青蟲，心尾，夜盜蟲，行軍蟲，地蠶。

### 斜紋夜盜

(四) 寄生植物種類：菸草、棉花、豆類、馬鈴薯、番茄、茄子、高粱、胡瓜、花菜及豌豆等。

(五) 葉片部份：菸葉背面有斜紋夜盜幼蟲則應注意施藥於葉背上。



受害為蟲幼齡蛉

(六) 藥劑防治：經試驗結果，下列各種農藥，對該二種害蟲均有效，但防治菸草齡蛉幼蟲應法意施藥於莖部嫩葉，防治斜紋夜盜幼蟲則應注意施藥於葉背上。



蟲幼齡蛉



蟲幼齡蛉

(七) 灰色或淡綠色，體軀第十及第十一節的背部各有二個三角形的大黑紋，其他各節具有半圓形的黑紋，但以第四節的黑紋最大，第二與第三節的黑紋間雜有黃色的圓形斑點。

(八) 有二個三角形的大黑紋，其他各節具有半圓形的黑紋，但以第四節的黑紋最大，第二與第三節的黑紋間雜有黃色的圓形斑點。

因菸係利用其葉片部份，爲預防殘留農藥對人體的毒害，在收葉前二星期內，應停止施藥。部份農有施用安特靈及巴拉松等劇毒殺蟲劑以防該二種害蟲的，實欠安全，菸草摘芯後，尤應嚴禁施用。

### (九) 徒手捕殺：

經常巡視田間，發見葉背上又有斜紋夜盜卵塊或初齡幼蟲，立將葉片摘下燒燬。蛀食芯部嫩葉的菸齡蛉幼蟲更容易發見，可以兩指將之撮死。所以如果時間許可，經常巡視田間徒手殺蟲，也是一種有效的方法。

在苗床期以至本圃摘芯期均可施用。  
③ 五〇% 馬拉松乳劑五百至一千倍液，或馬拉松乳劑與 DDT 乳劑的混合液，最宜在本圃後期施用。同時並可防治發生在本圃後期的蚜蟲。

在苗床期以至本圃摘芯期均可施用。  
③ 五〇% 馬拉松乳劑五百至一千倍液，或馬拉松乳劑與 DDT 乳劑的混合液，最宜在本圃後期施用。同時並可防治發生在本圃後期的蚜蟲。