

一治防意注

牛羊肝腫病

元 培 季

牛羊肝腫病，是一種寄生蟲，名叫「肝腫」，寄生在牛羊體內，所發生的寄生蟲病，害了這種病的，大都瘦弱死亡，容易為畜主所忽略。最好的預防方法是放牧地的草源要保持清潔。平時注意畜舍的環境衛生。每年請獸醫作定期檢查，發現有病，立即用藥物治療。

當硫酸銅和螺體接觸後二十四小時可致死亡，但對螺的卵並無效果，所以隔十八到二十二天後要再重複處理一次，比較安全。牧場或螺體較多的地區，可用硫酸銅溶液一千八百二十公升，使充分溶解，以免阻塞噴霧器。噴霧時凡植物莖葉的下部都需要充分噴到並不能因而殺死，所以經過二十二天還要再重複噴霧一次。

用噴霧法殺死。用十五公斤的硫酸銅加水一千八百二十公升，使充分溶解，以免阻塞噴霧器。噴霧時凡植物莖葉的下部都需要充分噴到並不能因而殺死，所以經過二十二天還要再重複噴霧一次。

定期檢查可以預防

肝腫的成蟲，體長約七分至一寸半，寬三分至五分，體形前部比較後部為寬，灰棕色，扁平形，有一個圓錐狀的突出部和一個口，還有一個腹吸盤。專門吸收牛羊的肝臟、胆汁和因內部發炎而滲出的汁液等為食料。

患肝腫病的動物，沒有一定的症狀發生，即使患了重症，外表也和正常的一樣，因此不容易為農友們所注意，但是仔細觀察，牛羊患有這種病的，大都營養不良，皮毛粗糙，並有瀉痢的現象，放牧時或運動時，每自鼻羣中落後，食慾也減退，偶然也有在下頸部發生水腫的情形，一直到嚴重時，瘦弱而死亡。

判斷牛羊有無感染肝腫病，應每年或定期請專業人員檢查畜羣的糞便，有無此蟲卵？並且要在適當時期做兩次以上的檢查才算安全。如果蟲卵時，應該立即設法驅蟲，並和其他健康牛羊隔離，防止傳染。

用硫酸銅撲滅螺旋體

預防肝腫，最好從根本上注意環境衛生，平時注意牛羊的飼養和管理，避免採食生長在

溪邊、池塘、或溝渠等地區的草類。除用人工或其他方法撲滅螺旋體外，也可利用硫酸銅撲殺。

治療牛羊肝腫病，可用Hexachlorethane，作暫時性的治療，牛一次口服可驅除肝腫百分之九十二，羊亦有百分之九十四的功效。小牛和仔羊要全羣同時服用。

用量是每體重四十五公斤用十公分，體弱的牛羊和已經感染很嚴重的可以略為減少。給藥前晚上，先禁食飼料一次，第二天早晨口服本藥。


沒有成熟的肝腫幼蟲，在第一次服藥時無效，可能因為第一次服藥時肝腫還停留在肝裏，所以在二十一後需要重複一次。

本藥對成熟的肝腫有效，但是對於牛羊肝腫寄生而引起的病狀並沒有功效，祇有等牛羊體內沒有了肝腫，自然會逐漸康復。

已經發現有嚴重感染的畜羣，每年要舉行兩次以上的驅蟲工作，新購入的牛羊，在確知沒有患肝腫病後再放入畜羣中。



書，字，學會也年三。
。（金完）雄學會



，是滿滿的新舊文古籍，示教有為自己氣福有在實冊看！



，期時新紀世十二，紙景好異月新日農士，人的商工開有書着來間時有

養成讀書好風氣

龔君圖

母豬缺乳怎麼辦？

張聯欣

飼養母豬的農友們，可能會遇到母豬分娩後，無法泌乳，或者乳量不足的情形，乳豬常因吃不到乳而餓死，或因吃不飽而衰弱致死。為了避免受到這種意外的損失，必須在飼養管理上多加注意和事前給予藥物的治療。

誘發原因

母豬缺乳的原因很多，除了飼養管理不善而引起以外，還有下面的幾種情形也會使母豬缺乳：一、先天性乳房發育不良或患乳房炎。二、腦下垂體後葉荷爾蒙分泌不足。三、母豬過肥，乳房脂肪過多，乳腺萎縮。四、母豬患產褥熱或產後子宮受化膿性病原菌感染，引起子宮內膜炎。五、飼料中鈣和維他命供給不足。

不同症狀

母豬的乳房不膨脹，不泌乳，雖經乳猪作頻繁的哺乳動作仍吃不到乳。母豬很快地缺少水份、消瘦、沒有精神而全胎在一、二天內相繼餓死。

狀物

母豬患乳房炎，產後不久，乳房腫大，緊張潮紅、硬化、手觸有熱感、疼痛、乳汁中有絮狀物、褐色混濁，有時會混有血液。

母豬產褥熱，突然高熱到攝氏四十二度以上，劇烈戰慄，呼吸促迫，對乳猪不很關心。患子宮內膜炎的，陰部流出很粘的惡臭惡露，重的全身發熱或顫抖等。以上各症都會使母豬食慾不振，甚至廢絕，更促成泌乳缺乏或無乳的現象。

預防治療

母豬產前不要養得太肥，接近分娩期，如果乳房還不腫脹，便證明乳腺發育不全，這時就應加以注意。

母豬分娩前，應洗刷猪欄，放入乾淨的薦草，分娩前後，注意飼養管理。給點容易消化，富有鈣和維他命乙的飼料，如臘脂乳粉，好的魚粉，麸皮，米糠，和好的青飼料等。

母豬若患乳房炎，產褥熱，子宮內膜炎，應立即請獸醫診療。一般治療的方法如下：

注射水質或油質的配尼西林，使它消炎、解熱、恢復食慾，自然可以增加泌乳量。


患乳房炎的應併用熱布溫罨按摩，或塗擦樟腦軟膏，都可以消炎和促進治癒。
如果是子宮炎，亦應併用洗滌子宮，並注入抗生素磺胺劑的混合注入劑，如亞東農藥廠出品的磺黴混荷精，治癒較快。

如果是乳腺發育不好的，可服用Mamain（是由棉子抽出的成份）有刺戟乳腺的作用。

凡是荷爾蒙不足的，應注射腦下垂體後葉荷爾蒙如Pitocin或Syntocinon十至十五單位二次，並用複方維他命乙，一定可以增加泌乳量。

如果採用以上各種處理，還是無法增加泌乳量時，所餘的乳猪祇有用人工哺乳，餵以牛乳、山羊乳等來挽救乳猪的生命。

訂正：本刊上期十頁「利用教槽飼料」一文更正如下：第一種飼料「可果與加格」應改爲○・五，第二種飼料，漏列「魚精二」，食鹽應改爲○・五。



(情可) 四寫無判書色黃
阱陷人(人引) 喷墨色黑
，醫不就辱色中紅
！(妾不) 碟愛無毀燒冊歹

，伊看來通喚(判書)，意注良意，是歹了看冊與神精
，伊管無(事)，意風好書讀，看冊志耕，書讀志耕，是歹了看冊與神精

，伊管無(事)，意風好書讀，拿時下天中養，是歹了看冊與神精