

綠竹可以集中育苗

王進生

綠竹的繁殖，多用分株法。如將分株時所剩的竹桿，作為集中育苗之用，可說是一舉兩得。每分地苗圃可以培育五千四百株苗，供十公頃本園之用。除了綠竹，麻竹、麻竹變種、烏腳綠等都可以集中育苗。

綠竹的品質幼嫩，內外節都很受歡迎，消費量一天比一天增加，綠竹苗的需要量也一年比一年增加。

綠竹苗的繁殖，過去多用分株法，同時也可以利用竹桿繁殖。如將分株時所剩的竹桿（切斷部份），作為集中育苗之用，可說是一舉兩得。

選擇竹桿

十二到十五個月齡的竹桿最適合作本繁殖之用；因為這時發芽力強，發根力也強，可以全部成為竹株。初年生的竹桿成熟度不夠，往往在尚未發芽前引起腐爛或枯萎。老竹桿發芽力差，所發生的芽也細弱；不適合本方法之用。

每段二節


竹桿的節數，以二節為宜，因為搬運栽植都比較方便。用鋸鋸斷後，在二節的中央開一小穴，以便栽植時注入清水，防止竹桿乾枯，促進發芽發根。側枝發生點不可除去或損傷，如有損傷就不會發芽。

盆地設圃

苗床宜設在排水良好且保水力良好的土地。灌水應方便，育苗初期雨水應充沛；土質以壤土為宜，粘質土因土壤本身吸水力強而易發生乾燥，在夏季竹苗根尚未充分發達前容易引起竹苗枯萎。地勢以盆地為佳。

一二月栽植

繁殖的時期，以新芽（新枝）尚未發生以前，即一至二月最為適宜。因為此時雨水多，土壤



。穴開節節，節二段每

農藥成份標準 保證品質優良

- | | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| 經銷處： | 臺北市迪化街二段 249 號
電話 46732 52660 |
| 臺北：新茂藥行 | 臺北市通遠街 87 號
電話 30879 |
| 臺北：果群行 | 桃園縣中興鎮民權路 34 號
電話 321 號 |
| 桃園：豐年農藥行 | 新竹西大路 105 號
電話 1425 |
| 新竹：新竹青果產銷合作社 | 竹南鎮八德街 45 號
電話 6227 |
| 苗栗：果農行 | 臺中市向陽路一段 13 號
電話 4384 |
| 臺中：通豐行 | 南投縣南投鎮民族路 113 號
電話 2248 |
| 臺中：國泰農藥行 | 臺中市漢口路 327 號
電話 78863 號轉 |
| 南投：泰生保命堂 | 彰化市新華里民生路 106 號
電話 401 |
| 彰化：美豐行 | 臺中市向上路一段五號
電話 6227 |
| 德榮行 | 臺北市新華里民生路 106 號
電話 401 |
| 總發行：德豐行 | 嘉義市新華里民生路 106 號
電話 401 |
| 雲林：德榮行 | 嘉義市新華里民生路 106 號
電話 401 |
| 嘉義：一年豐農藥行 | 臺南市公忠路 173 號
電話 3497 號 |
| 臺南：隆泰農藥行 | 高雄市中正西路 180 號
電話 21069 |
| 高雄：富農地產行 | 花蓮：師協成種子行 |
| 花蓮：師協成種子行 | 臺東：花蓮市中山路 88 號(彰化銀行對面) 電話 156 |
| 臺東：花蓮市中山路 88 號(彰化銀行對面) 電話 156 | 宜蘭：日豐肥料行 |
| 宜蘭：日豐肥料行 | 屏東：和成行 |
| 屏東：和成行 | 屏東市民生路 240 號 |



巴拉松乳劑
PM 乳劑
馬拉松乳劑
安特靈乳劑
地特靈乳劑
DDT 乳劑
魚藤精乳劑
利我農乳劑

中農化工廠股份有限公司出品

總公司：台北市南陽街廿一號 電話：三一六六〇
工廠：台北縣景美鎮中正路三一七號

現貨供應

業事農酪的本日

戰後日本的酪農事業，採取質量並重的改進方法，就是說，一面努力增加乳牛頭數，一面致力優良乳牛的輸入。一九六二年，日本全國乳牛頭數增達一百萬二千頭，酪農戶四十二萬戶，每戶平均飼養二・四頭。乳量方面，每頭每日平均泌乳量十三公升。

日本乳牛配種的年齡，也比以前稍為提早。本來是滿十八個月齡才配種，而現在大部提早二個月，即以體重四百二十公斤，體高一百二十七公分為配種的標準。(陳錦南)

灌水除草

經常注意灌水、除草。如果發枝過多，應剪除部分以利主桿生長而培養良好的竹苗。每段二節宜每節留一枝作為主桿。主桿宜留大枝而且由較深部(節部)發生者為宜。經過培養一年後可以作為新造竹林之母竹。

這種繁殖方法，也可應用於麻竹，但成績較差一點。一般說來，綠竹、麻竹、鹿竹變種，烏腳綠等都可以集中育苗，然後定植。

定植的方法，可按分株法進行。

不易乾燥，且竹桿內養分尚未開始消耗(尚未發芽)，所以發芽成活率高。

在整地好的苗庄上，每隔六〇公分左右的距離埋一段(二節)；也就是說，每十公畝地可以繁殖五千四百株竹苗。這五千四百株竹苗，翌年可以種植十公畝的面積，唯一的缺點，是較分株方法遲一年才可採筍；因為竹苗的繁殖培養必須經過一年。


栽植溝深度約十二至十五公分，一面掘栽植溝，一面將一段一段的竹桿放在栽植溝內，以免栽植溝因暴露時間過長而乾燥。但在陰天或毛毛雨天進行則可不必隨掘隨栽。

竹桿放在定植溝後，須注清水於頂先開好的穴內，使水充滿竹筒。注水完後，用土覆蓋並鎮壓、灌水，然後再用鬆土覆蓋一次，以防土面龜裂減少土壤水分蒸發。如以稻草等數層畦面則更佳。

經過二至三星期後，由竹節開始發芽，此時不可動搖，以免枯萎。

栽植後一個多月時，用手拔草，但如用草類覆蓋畦面則不必拔草。

等到新芽伸至三十至五十分時施用稀薄液肥以促進生長。



林一植栽分公十六隔每

正豐農藥

為農友大豐收貢獻

防治水稻 一般病蟲害

- 巴拉松乳劑 登記證006號
- 美拉松乳劑 登記證225號
- 馬拉松乳劑 登記證056號
- P.m 乳劑 登記證122號
- 靈丹乳劑 登記證045號
- 拜耳銅粉劑 登記證201號
- 特製D.D.T乳劑 登記證279號
- 美果素乳劑 登記證258號



防治：水稻二化螟蟲浮塵子。
柑桔蚜蟲，介殼蟲。
蔬菜一般害蟲。

力拔山乳劑

農林廳登記證 207 號

防治：水稻柑桔果樹一般害蟲。

防治柑桔白粉病 可樂農 水和硫磺劑 登記證 172 號

地特松水溶粉劑

農林廳登記證95號



正豐化學股份有限公司

臺中縣 霧峯 電話 63 號