

業事農酪的本日

戰後日本的酪農事業，採取質量並重的改進方法，就是說，一面努力增加乳牛頭數，一面致力優良乳牛的輸入。一九六二年，日本全國乳牛頭數增達一百萬二千頭，酪農戶四十二萬戶，每戶平均飼養二・四頭。乳量方面，每頭每日平均泌乳量十三公升。

日本乳牛配種的年齡，也比以前稍為提早。本來是滿十八個月齡才配種，而現在大部提早二個月，即以體重四百二十公斤，體高一百二十七公分為配種的標準。(陳錦南)

灌水除草

經常注意灌水、除草。如果養枝過多，應剪除部分以利主桿生長而培養良好的竹苗。每段二節宜每節留一枝作為主桿。主桿宜留大枝而且由較深部(節部)發生者為宜。經過培養一年後可以作為新造竹林之母竹。

這種繁殖方法，也可應用於麻竹，但成績較差一點。一般說來，綠竹、麻竹、鹿竹變種，烏腳綠等都可以集中育苗，然後定植。

定植的方法，可按分株法進行。

不易乾燥，且竹桿內養分尚未開始消耗(尚未發芽)，所以發芽成活率高。

在整地好的苗床上，每隔六〇公分左右的距離埋一段(二節)；也就是說，每十公畝地可以繁殖五千四百株竹苗。這五千四百株竹苗，翌年可以種植十公畝的面積，唯一的缺點，是較分株方法遲一年才可採荷；因為竹苗的繁殖培養必須經過一年。


栽植溝深度約十二至十五公分，一面掘栽植溝，一面將一段一段的竹桿放在栽植溝內，以免栽植溝因暴露時間過長而乾燥。但在陰天或毛毛雨天進行則可不必隨掘隨栽。

竹桿放在定植溝後，須注清水於頂先開好的穴內，使水充滿竹筒。注水完後，用土覆蓋並鎮壓、灌水，然後再用鬆土覆蓋一次，以防土面龜裂，減少土壤水分蒸發。如以稻草等數層覆蓋則更佳。

經過二至三星期後，由竹節開始發芽，此時不可動搖，以免枯萎。

栽植後一個多月時，用手拔草，但如用草類覆蓋畦面則不必拔草。

等到新芽伸至三十五公分時施用稀薄液肥以促進生長。



林一植栽分公十六隔每

正豐農藥

為農友大豐收貢獻

防治水稻 一般病蟲害

巴拉松乳劑 登記證006號
 美拉松乳劑 登記證225號
 馬拉松乳劑 登記證056號
 P.m 乳劑 登記證122號
 靈丹乳劑 登記證045號
 拜耳銅粉劑 登記證201號
 特製D.D.T乳劑 登記證279號
 美果素乳劑 登記證258號



防治柑桔白粉病、可樂農水劑、登記證172號

防治：水稻二化螟蟲浮塵子。
 柑桔蚜蟲，介殼蟲。
 蔬菜一般害蟲。

低毒性
特效藥

力拔山乳劑

農林廳登記證 207 號

防治：水稻柑桔果樹一般害蟲。

低毒性
殺蟲劑

地特松水溶粉劑

農林廳登記證95號



正豐化學股份有限公司

臺中縣 霧峯 電話 63 號