

# 母豬配種好壞影響小豬頭數

• 澄 祖 謝 •

飼養母豬，為的是生產小豬，假使一頭母豬流產或生了死胎，或者生的頭數很少，那麼單以半年來母豬為了生產這一窩小豬，所吃掉的飼料費，就無法換回來，其他飼養管理等費用，也是白費了，所以保育小豬，要在養母豬前就開始。

## 好好照顧小豬，成活率便提高

從記錄上統計出來，母豬懷孕初期有十六、二個胚胎開始發育，但是到了分娩時，平均祇有九、四頭活的，這九、四頭能養大成為肥豬到市場出售的，祇有七、二頭了，從出生到出售肥豬，有二、二頭的損失，約佔出生頭數的百分之二十三，近年來對於這個問題，已經從多方面研究改進，如小豬生下後用電熱來保溫，用抗生素、維他命、礦物質等補助飼料，預防注射、防治貧血等方法，使小豬疾病減少，促進生長，這二、二頭的損失就可逐漸減少了。

## 營養足環境好，能多四頭仔豬

專家們指出如果飼料配合得法，能增加二至四個卵子，並且能使卵子獲得滋養長大，主要是在下列三個時期裏的飼料要多給些，而且飼料中的蛋白質含量要比平時高，如多給些豆餅、花生餅、魚粉等，飼料中含粗蛋白質量應佔百分之十八。

前面所說的這三個時期第一是在配種前五天起到配種後五天，第二在懷孕的後期預定產期的前一個半月起到生產，第三是在產後的哺乳期。在其他時期，飼料量可以比上述期間少三成，蛋白質含量也可降低到百分之十四左右，但應多給些青飼料，如甘藷蔓、紫雲英等。為了防止發生乳房炎，產前三天就該逐漸減少飼料，產後一、二天也給少些，到第六天才恢復正常的供應量。

母豬在冬天生產，最好設法使產房溫度保持在華氏五十至六十度，並在豬欄一角，設一電熱保溫器，或用一百支的電燈泡也可以，使小豬生下後不會受寒。母豬生產前，最好用溫熱的肥皂水把它的身體洗乾淨，尤其是乳房和陰戶附近更要緊，總之，生產的環境要溫暖、乾燥和清潔。

## 公豬精力充分，母豬可配兩次


一頭處女豬，經過選定並檢查無病，留為種用時，所餵飼料要注意，不要使母豬長得過肥，肥了不但浪費飼料，且易使胎兒發育受阻，轉為弱小，使窩重減少，通常在生後六至八個月就開始發情，但配種應在第三次發情時或更遲些，因為等到第三次發情時配種，可較第一次發情就配種會多生二、五頭。

發情第二天，是配種最好的時機，但實際上，要能看出這個最適宜的時期比較困難，所以可用兩次配種，來增加受胎的百分率，第一次交配儘可能在一發現發情時就實施，那麼第二次在相隔二十四小時後舉行，這種在發情時

祝君今年好運氣

龔君文  
中禾圖

### 新年快樂



日春賀  
真到喜  
緊好賀  
光陰好  
快景好  
又新又  
，氣運好

元旦今  
快樂年  
樂豐年  
欲收在  
，天春  
，時是正

元旦好  
賀禮好  
年豐年  
好信重  
，錢省又  
，意本明