

母豬配種好壞影響小豬頭數

• 登 祖 謝 •

飼養每豬，為的是生產小豬，假使一頭母豬流產或生了死胎，或者生的頭數很少，那麼單以半年來母豬為了生產這一窩小豬，所吃掉的飼料費，就無法換回來，其他飼養管理等費用，也是白費了，所以保育小豬，要在養母豬前就開始。

好好照顧小豬，成活率便提高

從記錄上統計出來，母豬懷孕初期有十六、二個胚胎開始發育，但是到了分娩時，平均祇有九、四頭活的，這九、四頭能養大成為肥豬到市場出售的，祇有七、二頭了，從出生到出售肥豬，有二、二頭的損失，約佔出生頭數的百分之二十三，近年來對於這個問題，已經從多方面研究改進，如小豬生下後用電熱來保溫，用抗生素、維他命、礦物質等輔助飼料，預防注射、防治貧血等方法，使小豬疾病減少，促進生長，這二、二頭的損失就可逐漸減少了。

營養足環境好，能多四頭仔豬

專家們指出如果飼料配合得法，能增加二至四個卵子，並且能使卵子獲得滋養長大，主要是在下列三個時期裏的飼料要多給些，而且飼料中的蛋白質含量要比平時高，如多給些豆餅、花生餅、魚粉等，飼料中含粗蛋白質量應佔百分之十八。

前面所說的這三個時期第一是在配種前五天起配種後五天，第二在懷孕的後期預定產期的前一個半月起配種，第三是在產後的哺乳期。在其他時期，飼料量可以比上述期間少三成，蛋白質含量也可降低到百分之十四左右，但應多給些青飼料，如甘藷蔓、紫雲英等。為了防止發生乳房炎，產前三天就該逐漸減少飼料，產後一、二天也給少些，到第六天才恢復正常的供應量。

公豬精力充分，母豬可配兩次

一頭處女豬，經過選定並檢查無病，留為種用時，所餵飼料要注意，不要使母豬長得過肥，肥了不但浪費飼料，且易使胎兒發育受阻，轉為弱小，使窩重減少，通常在生後六至八個月就開始發情，但配種應在第三次發情時或更遲些，因為等到第三次發情時配種，可較第一次發情就配種會多生二、五頭。


發情第二天，是配種最好的時機，但實際上，要能看出這個最適宜的時期比較困難，所以可用兩次配種，來增加受胎的百分率，第一次交配儘可能在一發現發情時就實施，那麼第二次在相隔二十四小時後舉行，這種在發情時

母豬在冬天生產，最好設法使產房溫度保持在華氏五十至六十度，並在豬欄一角，設一電熱保溫器，或用一百支的電燈泡也可以，使小豬生下後不會受寒。母豬生產前，最好用溫熱的肥皂水把它的身體洗乾淨，尤其是乳房和陰戶附近更要緊，總之，生產的環境要溫暖、乾燥和清潔。

祝君今年好運氣

龔君文
中禾圖

新年快樂




，年折又（快很陰光）緊真于日
，級景好閑人到春大
。氣運好年今賀祝

，喜歡真樂快旦元
，錢超大收豐年今一
，天春在計之年一
。時是正（力勞）拚拍天春

，意好本年賀旦元
，錢了又信浪連好上
。錢省又重意約節

母猪為什麼不發情？

張聯欣



在正常情形下，小母猪生產後四至六個月，雖然體格尚未發育完成，可是平均隔廿一天便會有反覆發情的徵狀，往往因為飼養管理不當，或者到了八至十個月，應該到了適於配種的年齡，但因體格發育較差，仍舊沒有或者看不出發情的現象，造成了畜主的損失，這是很值得我們重視的一個問題。

營養失調

不會發情

有些母猪根本不發情，或者外陰部週期性的稍為紅腫，雖然有輕微發情的樣子，但仍不容許公猪接近或交配，常使畜主感到煩惱。另有些外國豬血統的母猪，有時發情的徵狀並不明顯，沒有經驗的畜主往往看不出來，因此體格發育不完全，延遲了性的成熟。

也有因為過濃粉類如甘藷和脂肪如米糠等供給過量，運動量又不够，使母猪過肥，生殖器官裏留下太多的脂肪，使發育受阻，也是不發情的原因之一。

第二種原因是哺乳小豬的母猪，營養不足，飼料不够，或因其他疾病而使食慾減低，都可使母猪極度瘦削，即使離乳後也不容易回復體力，因此也不會發情。

發育不全

關係很大

一般性成熟延遲的母猪，大多是腦下垂體前葉，性腺荷爾蒙分泌不足，引起卵巢、子宮等性器官發育不健全，因此不發情，或者即使發情，也很微弱而不顯著。

雖然性器官已經發育，但是因為前面所說的荷爾蒙分泌得不平均，使卵泡發育不正常。過度的近親繁殖，多為純種母猪或外國種母猪，有時有不發情或發情不顯著的情形。

改善飼養

注意管理

如果飼養管理失當，體格沒有成熟，或是哺乳母猪，過於削瘦而下奶量仍多的，應多給些好而富有營養的飼料，增加飼料的份量，或者提早離乳，防止母猪體力過度的消耗。

用荷爾蒙

注射治療


凡在外觀上找不到原因而不發情，或者發情微弱的母猪，應該使用荷爾蒙治療，據專家們試驗的結果，單獨使用類似腦下垂體荷爾蒙的血清性「激性素」(如 Prolan A 或 Pennox) 或胎盤性「性激性素」(Prolan E 或 Puberogen) 約有百分之六十的效果。最好是把前面兩種合併使用，效果會更好，用量是母猪體重一百五十公斤以下的用五百個國際單位。一百五十公斤以上的用八百至一千個國際單位，注射在臀肌內，可以在一至七天內(大多是二至五天內)發情，即可配種。如果用以上各種方法治療以後，還是沒有發情的，不如早期淘汰反而經濟。



，年新過樂快君祝
，利順吳順雨調風五
。錢趁大收豐穀
。年豐卜喜歡人



，已自來福幸來未
。子日週觀樂份安努
。始開書拆拍力努
。餘有慶氣福年今



，年新是了週年舊
，遞驚免去過省反除
。時此趕來將新計