


母猪為什麼不發情？

張聯欣



營養失調

不會發情

有些母猪根本不發情，或者外陰部週期性的稍為紅腫，雖然有輕微發情的樣子，但仍不容許公猪接近或交配，常使畜主感到煩惱。另有些外國豬血統的母猪，有時發情的徵狀並不明顯，沒有經驗的畜主往往看不出來，因此體格發育不完全，延遲了性的成熟。

也有因為過激粉類如甘藷和脂肪如米糠等供給過量，運動量又不够，使母猪過肥，生殖器官裏留下太多的脂肪，使發育受阻，也是不發情的原因之一。

第二種原因是哺乳小豬的母猪，營養不足，飼料不够，或因其他疾病而使食慾減低，都可使母猪極度瘦削，即使離乳後也不容易回復體力，因此也不會發情。

發育不全

關係很大

一般性成熟延遲的母猪，大多是腦下垂體前葉，性腺荷爾蒙分泌不足，引起卵巢、子宮等性器官發育不健全，因此不發情，或者即使發情，也很微弱而不顯著。

雖然性器官已經發育，但是因為前面所說的荷爾蒙分泌得不平均，使卵泡發育不正常。過度的近親繁殖，多為純種母猪或外國種母猪，有時有不發情或發情不顯著的情形。

改善飼養

注意管理

如果飼養管理失當，體格沒有成熟，或是哺乳母猪，過於削瘦而下奶量仍多的，應多給些好而富有營養的飼料，增加飼料的份量，或者提早離乳，防止母猪體力過度的消耗。

用荷爾蒙

注射治療


凡在外觀上找不到原因而不發情，或者發情微弱的母猪，應該使用荷爾蒙治療，據專家們試驗的結果，單獨使用類似腦下垂體荷爾蒙的血清性「激性素」（如 Prolan A 或 Penmex）或胎盤性「性激性素」（Prolan E 或 Puberogen）約有百分之六十的效果。最好是把前面兩種合併使用，效果會更好，用量是母猪體重一百五十公斤以下的用五百個國際單位。一百五十公斤以上的用八百至一千個國際單位，注射在臀肌內，可以在一至七天內（大多是二至五天內）發情，即可配種。如果用以上各種方法治療以後，還是沒有發情的，不如早期淘汰反而經濟。



，年新過樂快君祝
，利順吳順雨調風五
。錢趁大收豐穀
。年豐卜喜歡人



，已自泰福幸來
。子日週觀樂份安
。始開書拆拍力努
。餘有慶氣福年今



，年新是了週年舊
，遞驚免去過省反
。時此來將新計
除