

——蟲害見常間田——

蛾·夜·紋·斜

——傳良張——

斜紋夜蛾(運紋夜蛾，夜盜蟲)是為害農作物最為普遍的一種雜食性害蟲，每年約發生八代，如蔬菜、花卉、果樹、雜糧、苗木等都會受害。成蟲容易與其他蛾類分別，主要在前翅上有灰白色斜走線紋，所以叫做斜紋夜蛾。

嗜食葉肉 為害普遍

成蟲白天潛藏在作物莖葉或雜草中，夜間才飛出活動並交配產卵。卵成塊狀，每塊卵數自十數粒至數百粒，每


平均一隻母蛾可產卵六隻母蛾可產三至六塊；、七、百粒，但也有一千粒以上的。卵在夏季約經二、三天，春秋約五、六天，冬季七至十二天孵化。初孵化的幼蟲，多羣集在原葉上嗜食葉肉，至第二或第三齡才逐漸分散遷移他處為害。三齡以前的幼蟲，體色雖有很多種，但大多由淡綠而變為近褐或近黑色斑紋，但是在頸部後的胸背有一對明顯

黑色瘤狀物，易與其他鱗翅類幼蟲區別。

幼齡幼蟲 較易防治

四齡以後的幼蟲，個體特別肥大，體色變化很多，且胸背瘤狀物不明顯，但大多仍留有黑色斑紋，且尾節背上也有二黑紋，其她各胸節的黑紋有時不明顯，多呈土色或黑褐色，夜間出土暴食作物葉部，但無切斷幼苗或莖芽現象，也無將食物拖入土中情形；這與地蚕(切根蟲)為害情形顯然不同。

老熟幼蟲潛入土中，口吐粗絹和唾液，自造土窩，在裏面化



蟲幼齡幼蛾夜紋斜...三圖




蟲成蛾夜紋斜...一圖



蟲幼齡四蛾夜紋斜...四圖




蛹化中土蛾夜紋斜...五圖




塊卵蛾夜紋斜...二圖

蛹。防治斜紋夜蛾幼蟲，以三齡以前較容易，如二、五%DDT乳劑、五十%文賽、十%BHC乳劑、五十%馬拉松等加水五百倍，及BHC、DDT粉等都有良好效果，但如防治四齡以後幼蟲，應酌量提高藥劑濃度，才有顯著效果。

大生二十二



開路生



可利生



臺灣總代理

青象貿易有限公司

臺北市中正路一七五六號三樓

電話：三六一七七說

說明書附郵八角即寄

美國羅門哈斯公司在意大利附屬機構飛利多化學工廠出品

登記證一六一號

三磅裝

登記證一九七號

四磅裝

登記證一七五號

一公斤裝