

香蕉果指向彎曲後

是包紙最適當的時期

【問】：(一)香蕉在何時包紙最適當？

(二)包紙熟度較慢是否事實？

(三)如不包紙，致被日光晒紅，在收穫前一個月再包紙，聽說可恢復原來的青綠色是否事實？(旗山鎮新山里中山路一七三號吳英波)

【答】：(一)香蕉在果指向彎曲後包紙最適當，但在下市期間，開放後最好預先包紙，免受霜害。

(二)包紙蕉，可使香蕉果實發育更為充實，所以成熟稍慢。

(三)因為沒有包紙，致被日光晒紅，在收穫前一個月再包紙，可使稍微恢復原來的青綠色，但未能完全恢復。(朱慶國)

阿刺伯咖啡種苗

雲林嘉義都有出售

【問】：(一)阿刺伯咖啡種苗何處有賣？

(二)阿刺伯咖啡種苗的外形是圓球形或長形？

(三)山坡地土質較壞，可否種植？需每年下肥嗎？

(四)三年生平均每株可生多少？(臺北縣新店鎮安坑路四十一號陳恒祥)

【答】：(一)雲林縣經濟農場有咖啡種子、種苗出售。嘉義農試所亦有種苗供售。

(二)咖啡果實的外形是紅色橢圓形，每個果實通常含有兩個種子，種子為半扁圓形，少數僅有一個種子為橢圓形。

(三)山坡地土質較差，種植前應施多量腐熟堆肥，每株十公斤以上才可種植，每年仍需施用化學肥料。

(四)種植三年，管理優良的，每株平均可以收穫鮮果約二公斤。(朱慶國)

省產尿素和日製品同

施用得法才不會受害

【問】：今年二期作

蓬萊稻，在中午至下午四

時，田面乾燥的情形下施

用省製尿素，每分地六公

斤作追肥，結果稻葉變黃受了肥傷，過去日

製尿素可以在早晨有露水時作葉面施肥，省

產的却不可以，而且有害，請問是何道理？

(彰化縣二林鎮興華里水門巷一之三號羅淵鵬)

【答】：按前述方法施用尿素，有三點錯誤：

(一)田間土壤乾燥，不宜施用，應先澆水灌溉，使土壤潤濕，尿素才能分解。

(二)二期作天氣已熱，在中午施肥，陽光強烈，尿素接觸稻葉極為不利。日製尿素要在早晨有露水時施用就是這原因。

(三)追肥的用量每分地用六公斤，合每公頃尿素二七·六公斤，用量嫌多了一些，通常每公頃須施全量以八十公斤計，基肥用四十公斤，追肥兩次各二十公斤，約合尿素四三·五公斤，普通在較砂質的土壤尤宜多施兩次追肥，每次用稍少些，比較一次多施有效，更不致發生肥害。

【問】：(一)使用團粒尿素的方法如何？可否用紅土或改用洋灰床的土壤？

(二)每分地的施用量要多少？(彰化縣北斗鎮西德里斗地路二二三號陳懷)

【答】：(一)在澆水田或砂土區等吸肥力較差的水田裏，施用團粒尿素的肥效較高，所用紅土因為製成團粒方便，如改用洋灰用的土壤，能够粘成團粒狀也可以施用。

(二)普通是每分地的施用十五公斤至二十公斤尿素，和十倍至廿五倍的土壤，製成每粒五十公克的大小，施用在表土下十公分最適宜。(吳石生)



農藥成份標準 保證品質優良

- | | |
|----------------------------|--------------------------------|
| 總經銷處：
臺北：新蓬萊農產行 | 臺北市維多利亞路249號
電話：46732 52600 |
| 臺北：聚祥行 | 臺北市承德路87號
電話：30879 |
| 桃園：豐年農產行 | 桃園縣中興鎮民權路34號
電話：321號 |
| 新竹：新竹再果產銷合作社 | 新竹市西大路105號
電話：1425 |
| 苗栗：忠興行 | 竹南鎮八德街45號 |
| 臺中：豐豐行 | 臺中市西一路一段1號 電話：6227 |
| 臺中：國泰農藥行 | 臺中市南區南13號
電話：4384 |
| 南投：華生保苗堂 | 南投縣南投鎮民族路113號
電話：22號 |
| 彰化：美豐行 | 臺中市西區中一路327號
電話：秀榮63號轉 |
| 彰化：德榮行 | 彰化市新華里民生路106號
電話：401 |
| 嘉義：進豐行 | 臺中市西一路一段五號
電話：6227 |
| 雲林：德榮行 | 彰化市新華里民生路106號
電話：401 |
| 嘉義：年豐農藥行 | 嘉義縣新港鄉六桂村3鄰199號
電話：鹽水17之1 |
| 臺南：蓬萊農藥行 | 臺南市公南路173號
電話：3497轉 |
| 高雄：富農產苗行 | 高雄市中區四路180號
電話：21069 |
| 花蓮：邱協成種子行 | |
| 臺東：花蓮市中山路八號(彰化銀行對面) 電話：156 | |
| 宜蘭：日豐農藥行 | 宜蘭市吳沙路43號 |
| 屏東：和成行 | 屏東市民生路240號 |



巴拉松乳劑
PM乳劑
馬拉松乳劑
安特靈乳劑
地特靈乳劑
DDT乳劑
魚藤精乳劑
利我農乳劑

中農化工廠股份有限公司出品

總公司：台北市南陽街廿一號 電話：三一六六〇
工廠：台北縣樂美鎮中正路三一七號

現貨供應