

截斷尾節至多一半

【答】：(一)油桐樹防風的基本方法

結實影響太大。(林文鎮)

東部林班主產芳樟

九月採種即播爲宜

【問】：一、樟腦種籽何處有售？

（每斤價格若干？）（臺東縣大武壠大武街二〇六號李富傑）

【答】：所稱樟腦種籽，可能是指芳樟，芳樟主產在東部和中部山麓地區，母樹都在林班裡，由林區管理處自己採種的每公升五、六十元，每年九月採種，立即播種可提高發芽率，如果採取後過了一個月，發芽率減半或全無，必需購買種子，可等明年六月間，就近到臺東鎮內關山林區管理處申請代採。（林天良）

平地不適栽培梅樹
氣候異常會早發芽

【問】：本人種植梅樹十多年，奇怪的
是今年九月初，枝梢就吐出新綠，相當茂盛
，不知是何原因？會影響結果嗎？（南投縣
水裡鄉玉峯村仁愛路二號陳清江）

【答】：梅樹原適於較高地方栽培，海拔低處往往有秋季發芽的現象。

你種了多年，秋季均未發芽，證明該地尚適合，而今年氣候異常，致有秋季發芽的現象，如果冬季冷得較遲，這些枝條亦有形成花芽的可能，否則明年可能產量減少，但不會完全不結果。

豫陽的方法要看栽培地方和管理方法而異，早春應施以肥料，避免晚夏過於乾旱和颶風吹落葉片等，如能在九月以後至十月再落即不會發新梢。如明年氣候正常，可能就沒有這種現象。（朱長志）

PCP 尿素有毒

過早插秧會減產

【問】：(POP)尿素的用途很廣，爲何不大量進口給農民使用？

(二)臺灣現在有二期作的水稻嗎？

(三) 一期作可在舊曆十一月上旬插秧嗎？

四水稻在舊曆一月中旬開花，對於產量有影響嗎？（臺南縣玉井鄉竹田村一〇九號）

10

【答】：PCP尿素用水田，有殺草和當作氮肥的兩種效力。可是因爲它不但對人有毒害，對魚類貝類也有劇毒，使用不便，所以沒有大量進口。

（在臺灣南部，有人雖可一年種植三季水稻，但無經濟價值。）

(三)在本省南部水稻早植地方，在舊曆十一月上旬插秧。在三、四月左右抽穗開花，往往可能遭遇寒流。如溫度降低到十七度左右時，影響水稻結實而減低產量，尤其中北部更有危險。

(四) 在開花期遇到低溫，結果大部份均不結實，影響穀產量百分之十五至八十不等。
(謝英鐸)

藥農豐正

為農友大豐收貢獻

防治水稻 一般病蟲害

防治：水稻二化螟蟲浮塵子。

柑桔蚜蟲，介殼蟲。

蔬菜一般害蟲。

低毒性
特效藥

力拔山乳劑

農林廳登記證 207 號

防治：水稻柑桔果樹一般害蟲。

低毒性
殺蟲劑

地特松水溶粉劑

農林廳登記證95號

巴拉松乳劑	登記證006號
美拉松乳劑	登記證225號
馬拉松乳劑	登記證056號
Pm 乳 劑	登記證122號
靈丹乳劑	登記證045號
拜耳銅粉劑	登記證201號
特製D.D.T乳劑	登記證279號
美果素乳劑	登記證258號



防治柑桔白粉病銹病 可樂農水和硫黃劑 登記證 172 號

正豐化學股份有限公司

臺中縣 霧峯 電話63號



香蕉果指向彎曲後

是包紙最適當的時期

【問】：(一)香蕉在何時包紙最適當？

(二)包紙熟度較慢是否事實？

(三)如不包紙，致被日光晒紅，在收穫前一個月再包紙，聽說可恢復原來的青綠色是否事實？(旗山鎮新山里中山路一七三號吳英波)

【答】：(一)香蕉在果指向彎曲後包紙最適當，但在下市期間，開放後最好預先包紙，免受霜害。

(二)包紙蕉，可使香蕉果實發育更為充實，所以成熟稍慢。

(三)因為沒有包紙，致被日光晒紅，在收穫前一個月再包紙，可使稍微恢復原來的青綠色，但未能完全恢復。(朱慶國)

阿刺伯咖啡種苗

雲林嘉義都有出售

【問】：(一)阿刺伯咖啡種苗何處有賣？

(二)阿刺伯咖啡種苗的外形是圓球形或長形？

(三)山坡地土質較壞，可否種植？需每年下肥嗎？

(四)三年生平均每株可生多少？(臺北縣新店鎮安坑路四十一號陳恒祥)

【答】：(一)雲林縣經濟農場有咖啡種子、種苗出售。嘉義農試所亦有種苗供售。

(二)咖啡果實的外形是紅色橢圓形，每個果實通常含有兩個種子，種子為半扁圓形，少數僅有一個種子為橢圓形。

(三)山坡地土質較差，種植前應施多量腐熟堆肥，每株十公斤以上才可種植，每年仍需施用化學肥料。

(四)種植三年，管理優良的，每株平均可以收穫鮮果約二公斤。(朱慶國)

省產尿素和日製品同

施用得法才不會受害

【問】：今年二期作

蓬萊稻，在中午至下午四

時，田面乾燥的情形下施

用省製尿素，每分地六公

斤作追肥，結果稻葉變黃受了肥傷，過去日

製尿素可以在早晨有露水時作葉面施肥，省

產的却不可以，而且有害，請問是何道理？

(彰化縣二林鎮興華里水門巷一之三號羅淵鵬)

【答】：按前述方法施用尿素，有三點錯誤：

(一)田間土壤乾燥，不宜施用，應先澆水灌溉，使土壤潤濕，尿素才能分解。

(二)二期作天氣已熱，在中午施肥，陽光強烈，尿素接觸稻葉極為不利。日製尿素要在早晨有露水時施用就是這原因。

(三)追肥的用量每分地用六公斤，合每公頃六十七點六公斤，用量嫌多了一些，通常每公頃須施全量以八十公斤計，基肥用四十公斤，追肥兩次各二十公斤，約合尿素四三·五公斤，普通在較砂質的土壤尤宜多施兩次追肥，每次用稍少些，比較一次多施有效，更不致發生肥害。

【問】：(一)使用團粒尿素的方法如何？可否用紅土或改用洋灰床的土壤？

(二)每分地的施用量要多少？(彰化縣北斗鎮西德里斗地路二二三號陳懷)

【答】：(一)在澆水田或砂土區等吸肥力較差的水田裏，施用團粒尿素的肥效較高，所用紅土因為製成團粒方便，如改用洋灰用的土壤，能够粘成團粒狀也可以施用。

(二)普通是每分地的施用十五公斤至二十公斤尿素，和十倍至廿五倍的土壤，製成每粒五十公克的大小，施用在表土下十公分最適宜。(吳石生)



漏水田用團粒尿素

每分地用十五公斤

【問】：(一)使用團粒尿素的方法如何？可否用紅土或改用洋灰床的土壤？

(二)每分地的施用量要多少？(彰化縣北斗鎮西德里斗地路二二三號陳懷)

【答】：(一)在澆水田或砂土區等吸肥力較差的水田裏，施用團粒尿素的肥效較高，所用紅土因為製成團粒方便，如改用洋灰用的土壤，能够粘成團粒狀也可以施用。

(二)普通是每分地的施用十五公斤至二十公斤尿素，和十倍至廿五倍的土壤，製成每粒五十公克的大小，施用在表土下十公分最適宜。(吳石生)

農藥成份標準 保證品質優良

- | | |
|----------------------------|--------------------------------|
| 總經銷處：
臺北：新運來興產行 | 臺北市維多利亞路249號
電話：46732 52600 |
| 臺北：聚祥行 | 臺北市承德路87號
電話：30879 |
| 桃園：豐年農產行 | 桃園縣中興鎮民權路34號
電話：321號 |
| 新竹：新竹再果產行合作社 | 新竹市西大路105號
電話：1425 |
| 苗栗：忠興行 | 竹南鎮八德街45號 |
| 臺中：忠興行 | 臺中市西一路一段5號 電話：6227 |
| 臺中：國泰農藥行 | 臺中市南區南13號
電話：4384 |
| 南投：華生保苗室 | 南投縣南投鎮民族路113號
電話：22號 |
| 彰化：美豐行 | 臺中市西一路一段327號
電話：秀榮63號轉 |
| 彰化：德榮行 | 彰化市新華里民生路106號
電話：401 |
| 嘉義：德豐行 | 臺中市西一路一段五號
電話：6227 |
| 雲林：德榮行 | 彰化市新華里民生路106號
電話：401 |
| 嘉義：年豐農藥行 | 嘉義縣新港鄉六桂村3鄰199號
電話：曉水17之1 |
| 臺南：蓬萊農業資材行 | 臺南市公南路173號
電話：3497轉 |
| 高雄：富農產行 | 高雄市中區四路180號
電話：21069 |
| 花蓮：邱協成種子行 | |
| 花蓮：花蓮市中山路八號(彰化銀行對面) 電話：156 | |
| 宜蘭：日豐農藥行 | 宜蘭市吳沙路43號 |
| 屏東：和成行 | 屏東市民生路240號 |



巴拉松乳劑
PM乳劑
馬拉松乳劑
安特靈乳劑
地特靈乳劑
DDT乳劑
魚藤精乳劑
利我農乳劑

中農化工廠股份有限公司出品

總公司：台北市南陽街廿一號 電話：三一六六〇
工廠：台北縣樂美鎮中正路三一七號

現貨供應