

截斷尾節至多一半

【答】：(一)油桐樹防風的基本方法

結實影響太大。(林文鎮)

東部林班主產芳樟

九月採種即播爲宜

【問】：一、樟腦種籽何處有售？

（一、每斤價格若干？（臺東縣大武鄉大武街二〇六號李富傑）

【答】：所稱樟腦種籽，可能是指芳樟，芳樟主產在東部和中部山麓地區，母樹都在林班裡，由林區管理處自己採種的每公升五、六十元，每年九月採種，立即播種可提高發芽率，如果採取後過了一個月，發芽率減半或全無，必需購買種子，可等明年六月間，就近到臺東鎮內關山林區管理處申請代採。（林天良）

平地不適栽培梅樹
氣候異常會早發芽

【問】：本人種植梅樹十多年，奇怪的
是今年九月初，枝梢就吐出新綠，相當茂盛
，不知是何原因？會影響結果嗎？（南投縣
水裡鄉玉峯村仁愛路二號陳清江）

【答】：梅樹原適於較高地方栽培，海拔低處往往有秋季發芽的現象。

你種了多年，秋季均未發芽，證明該地尚適合，而今年氣候異常，致有秋季發芽的現象，如果冬季冷得較遲，這些枝條亦有形成花芽的可能，否則明年可能產量減少，但不會完全不結果。

豫陽的方法要看栽培地方和管理方法而異，早春應施以肥料，避免晚夏過於乾旱和颶風吹落葉片等，如能在九月以後至十月再落即不會發新梢。如明年氣候正常，可能就沒有這種現象。（朱長志）

PCP 尿素有毒

過早插秧會減產

【問】：(POP)尿素的用途很廣，爲何不大量進口給農民使用？

(二)臺灣現在有二期作的水稻嗎？

(三)一期作可在舊曆十一月上旬插秧嗎？

四水稻在舊曆一月中旬開花，對於產量有影響嗎？（臺南縣玉井鄉竹田村一〇九號）

三

【答】：PCP尿素用水田，有殺草和當作氮肥的兩種效力。可是因爲它不但對人有毒害，對魚類貝類也有劇毒，使用不便，所以沒有大量進口。

（在臺灣南部，有人雖可一年種植三季水稻，但無經濟價值。）

(三)在本省南部水稻早植地方，在舊曆十一月上旬插秧。在三、四月左右抽穗開花，往往可能遭遇寒流。如溫度降低到十七度左右時，影響水稻結實而減低產量，尤其中北部更有危險。

(四) 在開花期遇到低溫，結果大部份均不結實，影響穀產量百分之十五至八十不等。
(謝英鐸)

藥農豐正

為農友大豐收貢獻

防治水稻 一般病蟲害

防治：水稻二化螟蟲浮塵子。

柑桔蚜蟲，介殼蟲。

蔬菜一般害蟲。

低毒性
特效藥

力拔山乳劑

農林廳登記證 207 號

防治：水稻柑桔果樹一般害蟲。

低毒性
殺蟲劑

地特松水溶粉劑

農林廳登記證95號

巴拉松乳劑	登記證006號
美拉松乳劑	登記證225號
馬拉松乳劑	登記證056號
Pm 乳 劑	登記證122號
靈丹乳劑	登記證045號
拜耳銅粉劑	登記證201號
特製D.D.T乳劑	登記證279號
美果素乳劑	登記證258號

防治柑桔白粉病銹病 可樂農 水和硫黃劑 登記證 172 號

正豐化學股份有限公司

臺中縣 霧峯 電話63號

