

香蕉果指向彎曲後

是包紙最適當的時期

【問】：(一)香蕉在何時包紙最適當？

(二)包紙熟度較慢是否事實？

(三)如不包紙，致被日光晒紅，在收穫前一個月再包紙，聽說可恢復原來的青綠色是否事實？(旗山鎮新山里中山路一七三號吳英波)

【答】：(一)香蕉在果指向彎曲後包紙最適當，但在下市期間，開放後最好預先包紙，免受霜害。

(二)包紙蕉，可使香蕉果實發育更為充實，所以成熟稍慢。

(三)因為沒有包紙，致被日光晒紅，在收穫前一個月再包紙，可使稍微恢復原來的青綠色，但未能完全恢復。(朱慶國)

阿刺伯咖啡種苗

雲林嘉義都有出售

【問】：(一)阿刺伯咖啡種苗何處有賣？

(二)阿刺伯咖啡種苗的外形是圓球形或長形？

(三)山坡地土質較壞，可否種植？需每年下肥嗎？

(四)三年生平均每株可生多少？(臺北縣新店鎮安坑路四十一號陳恒祥)

【答】：(一)雲林縣經濟農場有咖啡種子、種苗出售。嘉義農試所亦有種苗供售。

(二)咖啡果實的外形是紅色橢圓形，每個果實通常含有兩個種子，種子為半扁圓形，少數僅有一個種子為橢圓形。

(三)山坡地土質較差，種植前應施多量腐熟堆肥，每株十公斤以上才可種植，每年仍需施用化學肥料。

農業信箱來

信，請利用雙聯

明信片，或在來

信中，附寄普通明信片。

(四)種植三年，管理優良的，每株平均可以收穫鮮果約二公斤。(朱慶國)

省產尿素和日製品同

施用得法才不會受害

【問】：今年二期作

蓬萊稻，在中午至下午四時，田面乾燥的情形下施用省製尿素，每分地六公斤作追肥，結果稻葉變黃受了肥傷，過去日製尿素可以在早晨有露水時作葉面施肥，省產的却不可以，而且有害，請問是何道理？(彰化縣二林鎮興華里水明巷一之三號羅淵騰)

【答】：按前述方法施用尿素，有三點錯誤：

(一)田間土壤乾燥，不宜施用，應先澆水灌溉，使土壤潤濕，尿素才能分解。

(二)二期作天氣已熱，在中午施肥，陽光強烈，尿素接觸稻葉極為不利。日製尿素要在早晨有露水時施用就是這原因。

(三)追肥的用量每分地用六公斤，合每公頃尿素二七·六公斤，用量嫌多了一些，通常每公頃須施全量以八十公斤計，基肥用四十公斤，追肥兩次各二十公斤，約合尿素四三·五公斤，普通在較砂質的土壤尤宜多施兩次追肥，每次用稍少些，比較一次多施有效，更不致發生肥害。

(四)省產尿素和日製尿素是用同樣的原料，同樣的化學方法製成的。(肥料公司推廣處)

漏水田用團粒尿素

每分地用十五公斤

【問】：(一)使用團粒尿素的方法如何？可否用紅土或改用洋灰床的土壤？

(二)每分地的施用量要多少？(彰化縣北斗鎮西德里斗路二二三號陳懷)

【答】：(一)在漏水田或砂土區等吸肥力較差的水田裏，施用團粒尿素的肥效較高，所用紅土因為製成團粒方便，如改用洋灰用的土壤，能够粘成團粒狀也可以施用。

(二)普通是每分地的施用十五公斤至二十公斤尿素，和十倍至廿五倍的土壤，製成每粒五十公克的大小，施用在表土下十公分最適宜。(吳石生)



農藥成份標準 保證品質優良

經銷處：
臺北：新運來興產行
臺北：聚祥行
桃園：豐年農產行
新竹：新竹再果庭路合作社
苗栗：聚興行
臺中：豐豐行
臺中：國泰農藥行
南投：華生保苗堂
彰化：美豐行
彰化：德榮行
嘉義：德豐行
雲林：德榮行
嘉義：年豐農藥行
臺南：蓬萊農藥行
高雄：富農產行
花蓮：邱協成種子行
花蓮：市中山路八號(彰化銀行對面)
宜蘭：日豐農藥行
屏東：和成行

臺北市維多利亞路249號 電話：46732 52600
臺北市承德路87號 電話：30879
桃園縣中興路34號 電話：321號
新竹市西大路105號 電話：1425
竹南鎮八德街45號 電話：6227
臺中市西一路一段13號 電話：4384
南投縣南投鎮民族路113號 電話：22號
臺中市西一路一段327號 電話：秀榮63號樓
彰化市新華里民生路106號 電話：401
臺中市西一路一段五號 電話：6227
彰化市新華里民生路166號 電話：401
嘉義縣竹腳六桂村3鄰199號 電話：噴水17之1
臺南市公南路173號 電話：3497號
高雄市中正路180號 電話：21069
花蓮市中山路八號(彰化銀行對面) 電話：156
宜蘭市吳沙路43號
屏東市民生路240號



巴拉松乳劑
PM乳劑
馬拉松乳劑
安特靈乳劑
地特靈乳劑
DDT乳劑
魚藤精乳劑
利我農乳劑

中農化工廠股份有限公司出品

總公司：台北市南陽街廿一號 電話：三一六六〇
工廠：台北縣樂美鎮中正路三一七號

現貨供應