

豬舍保持七十度

單是有了好豬種和好飼料，還要有適宜的豬舍。本省農村現有的

根據專家們研究的結果，豬隻最適於華氏七十度左右的氣溫，氣溫過高，對猪隻增重和飼料消化都會受影響。可是本省地處亞熱帶，尤其在中南部一帶，終年大部份時間的氣溫，多在華氏七十度以上，在這種環境下，唯一的補救辦法是在豬舍內外，添裝沖浴和蔭棚等設備，使豬舍能經常保持涼爽。不但可減少發病，而且對於發育也有幫助。

注意保健病就少

在健康的時候，似乎誰也都會飼養，可是一旦不幸發生了病，往往不知如何是好，其實豬病果然可怕，但在平時，如果能做到下列各點，也就可以放心多了。

爲了預防豬瘟和豬丹毒等疫病的發生，應按期作預防注射，否則即使治好，仍有損失。
豬體中最普遍和最嚴重的寄生蟲病便是蛔蟲，輕的生長緩慢，重的會引起死亡。通常小豬在離乳後一個月就可除蟲一次，四、五個月大時再除一次。
不幸豬隻發生疾病，不管是普通病，或是傳染病，最好不要隨便給藥或輕易打針，應立即請獸醫來治療，免得延誤時間而遭到更多的困難和損失。

合併在一起飼養。

飼料和飲水，務要注意新鮮和衛生，已經發霉腐敗的飼料，不清潔的青料和飲水等，切忌不要餵，以免引起各種胃腸病。

爲了預防豬瘟和豬丹毒等疫病的發生，應按期作預防注射，否則即使治好，仍有損失。

豬體中最普遍和最嚴重的寄生蟲病便是蛔蟲，輕的生長緩慢，重的會引起死亡。通常小豬

在離乳後一個月就可除蟲一次，四、五個月大時再除一次。

不幸豬隻發生疾病，不管是普通病，或是傳染病，最好不要隨便給藥或輕易打針，應立即

請獸醫來治療，免得延誤時間而遭到更多的困難和損失。

養魚

劉嘉

問答

剛嘉

養草魚會有發展嗎？ 沒有意外，生存率可達百分之八十以上。

聽說魚怕反塘，如何可以預防？

魚塘水溫太高，水就混濁不清，魚容易

死亡，預防反塘的方法，最主要是不要使池水敗壞，一旦反塘，應該立刻灌注新水補救。

倘若突然發現反塘，要如何急救？

反塘以前，一定先有徵兆，每當清晨，

如果發現池魚多數會「浮頭」，

就是用鼻孔在水面呼吸空氣，經

過很久，不能恢復正常的，就可

以證明池水中氧氣的含量感到不

足，或者是水質已經變壞，要立

即更換池水急救。

如果養草魚，還有其他應該

注意的地方嗎？

飼養草魚，要草料新鮮，可

以增進草魚的食慾。


從魚苗養成大魚，生存率有幾成？

向魚苗商去買，例如臺北縣泰山鄉，桃園縣

楊梅鎮，苗栗縣竹南鎮，都有經營魚苗的。

從魚苗的養成，到可供捕撈上市，如果

（武動）刮相和拍相時爭競不休，工夫修業是擺！該應不武動想與



，代無變小化事大
(武動)刮相和拍相時爭競不休，工夫修業是擺！該應不武動想與

，代無變小化事大
(非是生免)代無攏步一人讓，害人(怕必不)驚美耐忍
，在自真和氣平心
，代無攏步一人讓，害人(怕必不)驚美耐忍
。知咱報德

，代無變小化事大
(幸萬)哉嘉上(省反)改愛着那氣皮
，在自真和氣平心