


# 米玉交雜東臺

## 項事意注培栽



瓊濬莊

### 適期播種

在臺東栽培玉米，春作應在一月下旬至二月上旬，秋作應在九月至十月間下種。十一月後氣溫下降，生育期延遲，產量減低；九月以前則螟蟲或颱風為害嚴重。

玉米抗旱力雖強，但在生育前期，土壤中仍須適度濕潤，尤其在種下時和幼苗初期，需水極為迫切，所以，在旱地種植玉米時，應在雨後或選較為潮濕的土壤下種，以免不發芽或發芽不整齊現象發生。

### 多施肥料

玉米吸肥力很強，施肥後，多能顯著提高產量，很少發生肥害，所以，應該多施肥料。

臺東區旱地大部份不能灌溉，容易遭受旱害，所以，在種植雜交玉米之前，應先施多量堆肥，這樣既可供給肥份，又可改良土壤，增加土壤保水力。

臺東區農友們栽培雜交玉米，通常只施用標準

施肥量(硫酸銨三百五十至五百五十公斤，過磷酸鈣二百至三百五十公斤，氯化鉀八十至一百公斤)的一半或三分之一，而且不施肥堆肥。以後栽培玉米，希望多多施肥，以利用位面積產量之提高。

### 注意灌溉

臺東一般農友，多不注意玉米的灌溉工作，玉米各生育期對水分的請求雖有差異，但在水利方便的地方，應在初期生育期及雄花抽穗期各灌溉一次。以後如能再灌溉二次更好。

### 防治病蟲

玉米最嚴重的害蟲是玉米螟，被害園常減收二至三成，嚴重時達五成之多。

抽穗前後玉米螟最容易蔓延，請用「安特靈」五百至六百倍液防治二至三次。果穗結實後請用「賽文」防治。

臺東區的玉米，常常發生黑穗病。發現病株時，應立即拔除燒掉。

各位農友如能注意上述各點，相信臺東雜交玉米的每公頃產量，一定能提高到五千至六千公斤。

\* \* \*

### 高雄一二一。暫無法供應

自本刊十三卷廿四期刊載水稻新品種高雄一二二號特寫以來，我們接到了很多農友們的來信，希望購買高雄一二二號的種子。因為來信太多了，無法一一答覆，特在這裏向大家作一個總報告。

水稻新品種高雄一二二號，是高雄區農業改良場即將推廣的品種，從今年第一期作開始，才要大量繁殖種子，供一般之需用。目前，種子量有限，確實無法賣給大家，如果大家準備試作，請在今年一期作收穫以後(五月下旬)來信訂購，但數量仍不能太多，希望大家原諒！

謝英鐸·鍾奕錦同啓

## 豐收可靠的秘訣請使用

綜合微量要素葉面散布劑

# 施 葉 養 元

(シオヤゲン)

嗎？情形大起，引起微量綜合「維他命劑」。發育畸形，葉片皺縮，不結實，收穫量減少。病至十天後，植物因「維他命劑」的效，能恢復原來的健康。植物因「維他命劑」的效，能恢復原來的健康。植物因「維他命劑」的效，能恢復原來的健康。

發育不良，收穫量減少。病至十天後，植物因「維他命劑」的效，能恢復原來的健康。植物因「維他命劑」的效，能恢復原來的健康。植物因「維他命劑」的效，能恢復原來的健康。

發育不良，收穫量減少。病至十天後，植物因「維他命劑」的效，能恢復原來的健康。植物因「維他命劑」的效，能恢復原來的健康。植物因「維他命劑」的效，能恢復原來的健康。



育成促苗 促進發育  
預防病害 防止落果  
提高糖分 改善品質  
提早收穫 增加產量

說明書 試本  
附八角 向本  
函索即寄

技術：日本液肥株式會社 (シオヤゲン本舖)  
製造：協和化學工業股份有限公司 (全省各農藥行均有售)  
臺北市 陰街 39 號 電話 46980