

過錯要不

紅誕聖

期時插扞的

吉三徐



聖誕紅又名猩猩木，可以盆栽，也可以插枝。花葉凋謝或紅色的花瓣脫落時，這時易成活。插植適期是農曆二月下旬，或三月下旬。

四月以後，枝葉已經陸續展開，還可以勉強插植，但要剪去一部份葉片，才容易成活。

你喜歡聖誕紅嗎？鮮紅的花葉，襯配着好看的綠色，又美觀又吉祥。花期從聖誕節以前開始，直到農曆春節以後，是理想的家庭花卉。

你羨慕鄰人的聖誕紅嗎？請你不要錯過今年的栽植時期。

。插植以前，先作下列準備工作：

培養土（床土）：壤土（砂質壤土亦可）六份，腐葉土或堆肥三份，河砂一份，充分混合。

插穗：將花凋落後呈休眠狀態的枝條，選取粗細中等充實者，以二—三節切成一段。過長的插穗，插後露出地面部份容易乾枯，影響發芽。

插床


：露地床，長寬視需要而定，深八寸。花盆最好用漆磁的。

先將露地床填滿培養土，插穗和地面成三十度角度斜插。露出地面部份約為穗長的三分之一，即插入土中為二節，露出土面為一節，如為二節插穗，可以一節入土，一節露土外。每間隔八—十寸插一枝，行距株距相同。

薄層的堆肥。以後經常保持濕潤即可成活。

插植以後，要避免搖動，以免傷及新根影響成活。七、八月時，所有插條均已生長茂盛，此時露地床裏的苗木，已可移植。移植時必須根部附土塊，原土愈多愈好，才容易成活。移植時用鏟挖取，定植深度不超過原來根基的深度，植後剪葉，並行灌水。

盆栽的成活苗，到六、七月時，換用六—八寸面花盆，內填以培養土，或調合砂一份



盆栽聖誕紅的修形標準

（或大豆餅）五份，過磷酸鈣少量，壤土七份，堆肥一份，充分拌勻後填入。

時大盆底孔墊二—三片碎瓦，移苗時勿掉土太多，深度和原盆差不多。

盆栽聖誕紅，於八月初時，在距離分枝點一、二寸處的枝條，施行剪定，促進側枝的生長，九月中旬，再就側枝施行摘心，以後一直到開花時，不行任何剪摘。如此全株枝條多且樹冠呈半圓形，開花時枝條向四方擴展，花朵分布均勻，艷麗壯觀。

露地栽植者於九月初，看

情形略加修剪樹形，修剪後施稀釋人糞尿以促進分枝。

最後一次的剪枝或摘心，不要遲過十月初旬，否則屆開花時，枝條不能充分生長，所開花朵極為稀疏，且不十分艷麗。

無論是盆栽或露地栽，於十一月上旬時，最好施一次液體肥料（腐熟豆餅水或硫酸水），以增大花冠。

本文作者徐三吉先生，請示最近通訊處。

— 編者

染髮當心 烏麗髮有毒

市面上有一種染髮劑「烏麗髮」出售，是用毒性藥料製成的，已經內政部命令省衛生處查禁，即日停止製造銷售，並吊銷它的成藥許可證。

「烏麗髮」是用「對苯乙胺」為藥料所製成的染髮劑，經衛生機關化驗結果，發現這種化學品的毒性甚劇，可能危害人體健康。現已由內政部下令，今後凡使用該項藥料的商品，一律禁止製造出售。