

！猪小了生

？顧照樣怎

十，鈣質百分之二，鹽百分之〇・五。

醱酵飼料和混合飼料的比率，因猪隻的體重而不同，現在舉兩個例子在下面：

(一)從小猪離乳到體重五十公斤以內的，用混合飼料十二公斤，加入醱酵飼料二十公斤。

(二)體重五十公斤以上到九十公斤的，混合飼料減為十公斤，醱酵飼料增加到二十七公斤。

按照以上的比例，把飼料配好以後，讓猪隻任意取食，不必再加限制。

此外有一點要注意的，就是在取用醱酵飼料時，要避免經常開路醱酵槽以免容易變壞，最好每次取出較多的用量，放在小桶裏，隨時把塑膠布蓋好，防止發酸而腐敗。

＊

＊

＊

＊

謝祖澄

本刊會談過母猪配種的好壞，會影響小猪的頭數。但是小猪從出生後到長成出售的當中，仍有損失二—三頭的可能，如果能把小猪照顧得好，便可以避免這種損失。

照顧小猪，要從母猪配種前約二十天開始。如果母猪有外寄生蟲，可以用二百倍牛猪安 (Neguvon) 或靈丹 (Lindane) 稀釋的水溶液，洗刷或噴射母猪的全身。接着在母猪配種前十五天左右，驅除內寄生蟲，也可以用牛猪安或 Pipeazine 製劑，用法要照兩種藥的說明書去做。

剪斷臍帶・修平尖齒

小猪生後第一天，要做下面四件事情：

(一)在小猪臍部三分處，用線結紮後，把臍帶剪斷，剪斷的部位，是在結紮處的下方，並在創口塗以碘酒。

(二)把小猪的尖齒八枚，用骨剪剪平，以免吸乳時，會把母猪的乳房咬傷而引起乳房炎。

(三)最好給每頭小猪剪耳號，以便作個別的紀錄，作為選擇的參考，至於剪耳號的方法，請參閱本刊十三卷十二期。

(四)口腔注射氣胺公司出品的金鐵素油劑猪得舒，可以防止白痢和猪肺炎。

小猪生後第三天，在猪欄一角，放置些乾淨的土塊，供小猪舐食，或另向藥房購買硫酸鐵 (Ferrous Sulfate) 一百六十公分，用一瓶 (醬油瓶) 熱水，把硫酸鐵先溶解，以後每天用這溶液，塗在母猪乳房週圍，讓小猪吮乳時，可以舐到，用來防止貧血，直到小猪自己會吃飼料時為止。

輔助飼料・預防注射

小猪出生半個月後，開始給小猪吃一些飼料，飼料中要加千分之一魚肝油和千分之五的維生素維他命和礦物質，作為輔助飼料，例如歐羅肥，生維質等都可以用。這樣可以促進生長，減少疾病。屏東縣農會配有仔猪飼料，其中就含有那些成份，飼養的成效很好，值得採用。


小猪生後第三十八天，凡是小公猪，都要去勢。

再隔兩星期就是到小猪生後四十二天，可以替小猪實施預防注射。

一直到第五十六天，小猪和母猪就開始分開飼養，如果發育良好的，可以提早離乳，但是提早離乳以後，必需要餵用好的小猪飼料，使它發育長大。



新春退還正時，
開闢代無不，
聞賭博(餵酒)通(可不)去；
不聞戲聽片！



高南都古平意，
高南都古平意，
高南都古平意，
高南都古平意。



橫斷公路巧又奇，
八掛山影彩風景優美，
大佛莊藏大八餘。