



怎樣栽培枸杞？

裕永楊

近年來，本省民間栽培中藥的風氣很盛，枸杞（九效）也是大家最感興趣的一種。根據中醫藥界的研究，枸杞可以治療高血壓，預防中風，而且還能強腎補精。下面向各位介紹枸杞的栽培方法。

枸杞有細葉和寬葉兩個品種，在山野也有野生的品種，但是野生品種的藥效和品質，都比栽培品種差。野生種和栽培品種，可以葉形來區別：就是說，普通栽培種的葉子是長卵圓形，野生種則稍為細長。

土地排水要良好

枸杞是耐寒性強的多年生灌木，在冬季嚴寒時，會落葉而進入休眠期，等到春季溫暖時，再發芽長出新梢。夏天在各節間開小形的花，秋天時結成像辣椒的小果；這就是枸杞的果實。枸杞本身對土質的選擇並不嚴格，但為提高結

實，應選砂質壤土栽培；粘質壤土會使葉部生長過茂。總而言之，栽培枸杞以排水良好日照充足的土地為佳。

放寬距離促生長

栽植枸杞，必需儘量放寬距離種植。最好的種植方法是：做一百公分寬的畦，每公頃施用腐熟堆肥五千公斤，硫酸銨三十公斤，過磷酸鈣二十公斤，鉀肥十公斤，作為基肥，充分整地後種植。種植時期：除了七至八月間的盛夏以外，均可種植，尤其以春期發芽前三至四月，五至六月，及秋期九至十月為適期。

成活後施用稀釋人糞以促進生育，立秋時以硫酸銨一公斤過磷酸鈣半公斤作追肥，並視生育情形酌施人糞尿。摘葉後施肥，可以促進新葉生長，效果較好。

扦插繁殖易成活

如前所述，除了七、八月以外，從春期三四月，至秋期九十月間，選擇新梢較多的枝條，在二十公分長的地方剪取，以十公分的株距扦插於無肥的河砂或山砂中，經約二星期即可發芽。成活以前，日中需設置遮蓋物遮陰（夜間、曇天及雨天均應除去）。成活發根時，春插的須以稀薄硫酸銨或人糞尿作追肥。於秋期九十月間定植。春期溫暖時，即自三、四月至五、六月定植。扦插時，在插苗基部塗布「布爾頓」等荷爾蒙，則可促進早日發根。

除了用葉部扦插外，也可以用根部繁殖。即將根部切成適宜的長度，平置埋入土中。這樣到了春期就會發芽；此時宜追施稀釋水肥以促進生長。

此外也可以用種子繁殖；即在秋季小果成熟時，用布包起揉碎洗水後即可。在早春播種，經十天左右即發芽。

噴藥防治病蟲害

枸杞對病蟲害的抵抗力比較強，但在盛夏時，會發生無數的黑色爬蟲、蝸牛幼蟲、瓢蟲和青蟲等，因此要撒布BHC防治。

病害有白粉病，在春期發芽時至盛夏期間發生於葉面。在發生前撒布「大生」粉劑四百倍，每星期撒佈一次，連續三至四次就可防治。其他如白銹病，則不易防治，只能在扦插繁殖時注意不要從已發生白銹病的母株採取種苗。

（上接第九頁）

稻浮塵子

一、開始發生時，每隔七至十天施用左表藥劑（任選一種）防治：

藥劑名稱	秧田期	本田期	稀釋倍數
二五 DDT 乳劑	一・六公升	二・四公升	五〇〇倍
五〇％寶文可濕性粉劑	〇・八公升	〇・八一	一、〇〇〇倍
一〇％DDT 粉劑	四〇公升	四〇公升	
一・五％寶文粉劑	四〇公升	五〇公升	

二、防治時稻田附近雜草亦應同時施藥。
三、稻黃萎病發生地區請參閱該病黑尾浮塵子防治辦法辦理。

四、在孕穗期尤應注意其發生及用藥。（信信）
註：依據植物保護技術審議委員會今年度年會決議，在同一病蟲害中，如推薦藥劑有二種以上時，概依乳劑（液劑）、可濕性粉劑、片劑、粉劑、粒劑之次序排列，同類形態則以名稱筆劃多寡為依據。

又為提高本省植物保護推廣效果，農林廳特商請臺中青果運銷合作社代辦統籌加印本年度植物保護推廣方法，加印部份暫定收工本費（1）全冊平裝本每冊二元，（2）糧食作物部份分裝本每冊一元二角，（3）特用作物部份分裝本每冊一元五角，（4）稻作部份分裝本每冊七角。有意加印者，可於二月十五日前逕明擬加印種類及冊數，連同加印費送交臺中青果運銷合作社，委託統籌加印。