

採藤養豬用的甘藷品種

·簡金寬·

甘藷藤含有多量的礦物質和組織維，可說是農家養豬最好的青飼料。但據試驗，採割甘藷藤後，甘藷塊根的收量都會減少，所以，最好是另外栽培專供採藤用的甘藷品種。

採藤品種·分枝力強

採藤用的甘藷品種，應該是莖葉生長迅速而茂盛，且採割後容易分枝。


據試驗結果，夏季以短蔓種「臺農二十五號」最適宜，冬季則以長蔓種「K二十五號」為佳。

臺農二十五號：嘉義農業試驗所育成，頂葉綠色，葉缺刻五深裂，綠莖，塊根下膨紡錘形，皮白色淡黃，肉色淡黃。春作割四次莖葉，產量共有三萬八千六百八十公斤，而秋作為一萬五千二百三十公斤。

K二十五號：嘉義農業試驗所育成，頂葉紫紅色，葉缺刻五淺裂，綠莖。塊根下膨紡錘形，皮紫紅色，肉色白，帶有紫斑心。莖葉產量：春作三萬三千三百七十公斤，秋作一萬六千一百七十公斤。

民國五十二年十一月十六日後新到包裝式樣：

大生二十二



登記證一六一號

三磅裝


開路生



登記證一九七號

四磅裝

可利生



登記證一七五號

一公斤裝

適期採割·營養最好

採割時期對甘藷藤的品質和產

量，任何時間都可以栽植甘藷藤，但因甘藷莖葉經採割半年後，生長勢力衰弱，產量減少，為提高莖葉產量，宜在春季及秋季各栽植一次；春季以三月，秋季以八月為栽植適期，在此時培植，採割利用期間較長。

斜挿定植·產量提高

採藤專用的甘藷，是以生產莖葉為主要目的，因此，可以用密植方法來提高產量。

斜植法使甘藷植株固定，能減少採割時植株的動搖和創傷。做畦方法：三公尺寬的大平畦，長度為三十公分，每畦插植十行，每公頃栽植約九萬株。

量影響很大。普通在插植後四十至五十天，留莖四至五節採割。此後每隔二十五至三十天，莖葉長大一公尺左右時，再選擇晴天露水乾後採割。提早採割生產量減低，延長採割莖葉變老熟，品質變劣，並影響下一次採割時期和採割量。

採割一次·施肥一次

甘藷藤愈嫩愈好，為了要生產嫩莖葉，必需施用多量的氮肥。豬糞尿是經濟而有效的氮肥，每次採割後，用鋤頭中耕株間並除草，然後在株間施用稀釋豬糞尿水肥，可以提高品質和產量。



號五十二農臺



號五十二K

臺灣總代理

青象貿易有限公司

臺北市中正路一七五號三樓

電話：三六一七七

說明書附郵八角即寄