

良的特點，曾在不久以前舉辦了一次羣糖豬和農家豬的比較研究，邀請臺北、基隆地區的家畜市場、屠宰公會、臺北縣政府、農林廳、農復會、省農會等機構和屠商們，各派代表在臺糖種畜場共同討論。會中由臺糖種畜場負責人報告兩種豬品質測定的研究經過，在座的屠宰商們把種畜場所列舉的各項數字，和他們自己的經驗相印證，莫不點頭稱是。

討論結果，大家一致承認羣糖豬的品質的確比較農家豬好得多，同時建議市場當局對於好豬，應該用高價收購，這才可以促進本省肉豬品質的改良。

豬的病毒性肺炎

表面看來並不明顯而實際上影響發育很大的「豬病毒性肺炎」，不可忽略，要及早預防。

病極普遍 豬病毒性肺炎分佈世界各國極為廣泛，本省發生這種病的也很普遍。發現肺炎的比率在百分之十八。〇八中，豬病毒性肺炎雖然祇佔百分之二・七七，但可證實本省亦有這種病的存在，應該提醒大家的注意。

豬病毒性肺炎的病原，是一種濾過性病毒，傳染力很強，不易破壞殺滅，在攝氏零度，或零下二十度凍結時，病毒在甘油裏，仍可生存三十二至五十五天之久。

影響發育 豬的病性肺炎是慢性肺炎，發病率雖高，但死亡率則低，常多發生在三至六週齡的仔豬，潛伏期約有十至十六天，經過二、三天短時間的腹瀉後，有短的乾咳嗽，乳豬則有噴嚏，但較大的豬就沒有這種病症。這種咳嗽的併發症狀，是豬病毒性肺炎的特徵，尤其在早晨餵料時，最容易發現，看起來精神還是好的。有些病豬咳嗽祇有一至三週，或者也有較為持久的，呼吸或食慾方面除了特殊情況外，一般都還是正常的。但發育不好，生長很慢，影響市場出售的損失很大，同時在豬齡第十六週時很容易復發。

預防方法 預防豬病毒性肺炎的發生，平時要注意衛生，隔離病豬，新進豬和原來的豬不要放在一起飼養。更可應用抗生素如金徽素放在飼料裏或混在飲水中，可以減少傳染。

在治療上，如果用青徽素、鏈徽素、氯徽素等藥劑治療，效果都不好。祇有應用四環素(Tetracycline)或氧化四環素(Oxytetracycline)，每頭豬每天給牠服用二至四克，在病毒未傳染前，有預防效果。

，下肉少，總之屠宰率要高。羣糖豬的品質就因為能適合以上所舉的條件，所以能勝過農家豬售價較高。

相反的在農家豬方面，不但生長緩慢，飼料消耗多，並且皮厚，骨頭大，胴體粗短，大腹便便，精肉少，下肉多，屠宰率低。這些缺點，和豬種、飼料以及管理技術等都有關係。請各位農友們參考本刊第二期「羣糖豬為什麼受歡迎」一文，從豬種的選擇、飼養、管理方面，多加研究改進，將來農家豬也可以一樣的賣高價錢。

訂正：本卷第二期「羣糖豬為什麼受歡迎」文內幾種飼料配合法均漏列「脫脂米糠百分之十」特此更正。

趙法清



，害屬(都)攏仔賊鈕剪
，該應是防偵底平
，察警提據現發
。代好上安平家大

，(畜六)牲高飼業耐材農
，(和)甲鷄鴨鵝羊鴨
，(安)勢好開欄畜眠眠
。去捉捉仔賊乎免

(寧代)壞做來，才元狀仔賊講人
出(夜半)跟半
，好開着扇門窗風
。內入進仔賊免以