

怎樣防治

香蕉萎縮病

莖象鼻蟲

粉介殼蟲？

· 悟 信 ·

下面是本年度植物保護技術審議委員會新修訂三種香蕉病蟲害的防治方法。

香蕉萎縮病

- 一、蕉苗必須採自無病蕉園。
- 二、以煤油噴射病株，可殺死病株上之蕉蚜及促使病株腐爛。
- 大株病蕉（二公尺以上）：每株噴射煤油三百公撮。
- 中株病蕉（一至二公尺）：每株噴射煤油二百公撮。
- 小株病蕉（一公尺以下）：每株噴射煤油五十至一百公撮。
- 三、煤油處理後之病株，經五天至一星期開始腐爛，即連球莖掘出，砍碎曬乾，注意勿令病株吸芽重出。

香蕉莖象鼻蟲

- 一、經常清園，以保蕉園清潔。蕉果收穫後，即砍伐老株，並加砍碎曝曬。
- 二、第一次施藥：十月間以五十%「地特靈」可濕性粉劑七百倍稀釋液，用噴霧器噴於香蕉假莖上，自假莖基部至最高葉鞘部，每株平均噴射稀釋液三百五十公撮（每株原藥○.五公克）。
- 三、第二次施藥：臺中、雲林、嘉義地區十二月，高雄、屏東、臺南地區翌年一月，依照第一次

施藥方法噴射。

四、莖內如有發生幼蟲時，請看參考資料。

香蕉粉介殼蟲

- 一、施藥前先清園。
- 二、第一次施藥：一月至二月，香蕉未抽穗期間，施用治蟲、防蟻兩種藥劑：
- （一）治粉介殼蟲：以六十%「大利農」乳劑一千二百倍稀釋液，用噴霧器噴射於香蕉假莖上，自基部噴至最低葉之葉鞘部，每株平均噴射稀釋液四百公撮。
- （二）防蟻：施用「大利農」之後，即以四十%「阿特靈」可濕性粉劑二百五十倍稀釋液，噴射於蕉株根部四周一公尺之地面上，每株平均噴射稀釋液二百公撮。
- 三、第二次施藥：四月至五月，施用治蟲、防蟻兩種藥劑：
- （一）治粉介殼蟲：以六十%「大利農」乳劑一千二百倍稀釋液，用噴霧器噴射於香蕉假莖上，自基部噴至最高葉之葉鞘部，以及三分熟度以上之蕉果及果柄上每株平均噴射稀釋液八百公撮。
- （二）防蟻：施用「大利農」之後，照第一次施藥方法，噴射「阿特靈」。
- 四、緊急處理：如在集貨場再發現蕉果有蕉蟲時，即刻追究蟲源，以六十%「大利農」乳劑一千二百倍稀釋液，用動力微粒噴霧機，加裝特製噴果器，噴洗六分熟度以下之蕉果，每株平均噴射稀釋液二百公撮，但在二十天內要收割之果實不可噴藥。

香蕉莖象鼻蟲防治方法參考資料：幼蟲已侵入假莖為害時，以「蕉特靈」一千倍稀釋液，注射於假莖中部，注

入藥液量，以上方外溢為度（每株二百公撮左右，原藥○.二公撮）



家畜育肥法之大革命 • 全國首創 •

最新育肥藥 • 風行全省

肥 聖

宮大豬肥育聖品
節省飼料2成，肥育2成，人畜無害。

育肥針

去勢兼育肥
已去勢可促進肥育，免用外科割除手術法，使用方便一針見效。



家畜藥品總匯 • 應有盡有 •

全國第一家輸出暢銷東南亞

萬畜素

抗白痢、增乳、提早離乳。

全省最新，補助飼料兼治療藥，含四種美國仙丹與禽畜萬病特效藥。

最新抗白痢菌及強肝與營養豐富之15種維他命6種礦物質。

家畜疫苗血清

萬力牌優秀藥

獸醫用儀器

總經銷 萬力大藥廠
(疫苗、血清) 代銷處 省立家畜衛生試驗所

家畜藥品供給中心 博濟大藥房獸藥部

臺北市西寧南路130 電話37112 郵劃4616 李廷棠