

屏東農友 怎樣防治 菸草病蟲？

採用無病蟲菸苗

除在移植時注意選擇外，應在苗圃時期徹底防治病蟲害。移植前一星期左右，菸苗須用二十五%D D T乳劑四百倍溶液全面噴射，殺滅各種害蟲。移植前三天左右，並須用「谷樂生」三千至四千倍溶液噴射菸苗，以防菸草疫病發生。

D D T 防治青蟲

移植後約十天，應防菸草青蟲發生。使用二十五%D D T乳劑四百倍溶液，在各菸株葉面全面噴射。

本圃初期氣候晴朗，溫度濕度調和，適宜各種害蟲繁殖，所以，在菸田工作時，必須特別注意有無青蟲發生，如有發現，應即使用二十五%D D T乳劑四百倍溶液噴殺，千萬不要延誤時期。因為等到青蟲長大，全身烏毛脫落（約一星期程度）時，就是用一百倍溶液也可能無法防治，所以，各菸農防治青蟲，應提早噴藥，最好在移植後，每隔八至十二天左右，定期噴射二十五%D D T乳劑四百倍溶液，來做徹底的防治。

大生防治斑點病

白星病、赤星病為害，對於葉品質影響最大。但是這兩種病害，現今只要認真噴射「大生七八」四百至五百倍溶液，就可以有效防治。即在菸草移植本圃約三星期左右（正好是大培土後），使用「大生七八」四百至五百倍溶液，在各菸株葉面全面

噴射。以後約每隔二星期左右，再噴射一次，就可以完全防治了。
防治白星病、赤星病時應該特別注意的事項是：如遇降雨時，所噴的藥劑很容易流失，應該在降雨後天晴時，迅速重新噴射一次。


馬拉松防治蚜蟲

菸草蚜蟲繁殖很快，吸取菸葉養液，使菸葉生長不正常，品質大降低。所以，在菸株上一發現蚜蟲，就應該馬上使用五十%「馬拉松」乳劑一千至一千五百倍溶液噴射防治。
白粉病為害後所產生的菸葉，與菸草蚜蟲為害後所產生的很相似。防治方法：普通用硫化鉀、石灰硫黃合劑四百倍溶液噴射防治。
使用水和硫黃劑八百至一千倍溶液噴射防治亦可。

使用各種硫黃製劑防治菸草白粉病，應該隨氣溫高低調節藥劑濃度，就是說，氣溫高時要用稀薄藥劑，氣溫低時應用濃厚藥液，否則不能獲得滿意的效果。



菸草蚜蟲為害情形



菸草斑點病葉

果樹病害

冬期防治劑

日本 **ク ロ ン** 500g入

適用病害

- 柑桔：瘡痂病、黑點病、其他病害。
- 葡萄：黑痘病、褐斑病、毛氈病。
- 梨：黑斑病、黑星病、赤星病。
- 梅：黑星病。

其他果樹類：均可使用。

使用時期：1月～3月上旬發芽前。

現貨供應處：**豐裕農藥行**

員林鎮民生路230號

春植菸草摘蕊

避免過早過深

菸草摘蕊的時期和深淺，應視菸株生育情形而定。但是春菸後期生育旺盛，除特殊原因外，應避免過早或過深摘蕊。
普通在移植後四十五至五十日開始摘蕊。最好分兩次舉行：第一次在花蕾與最頂小葉尖並齊時，將花蕾摘去，經過七至十日後，再視菸株生育情形作第二次摘蕊的深淺標準。

如在小培土時發現矮小，着葉數少，菸幹又較細的不正常菸株時，可留二至三片葉摘去其蕊，並留一支腋芽，使長大收穫，以補償損失。

(松)

以和赤星病、白星病防治藥劑混合使用，以節省人工。

除了上述各項，注意田間管理，合理施肥，使菸田日照通風排水良好，清理菸田週圍，也可以防止各種病蟲害潛伏，減少發生的機會。（陳日域）