

屏東

春作

菸草

移植

管理

要點

株距不宜過寬

張學松

慎選本圃地點

春菸本圃，除具備秋菸選地條件外，還應顧及春作期間天然條件之不同，注意下列幾點：

(1) 選擇不受北風直接吹襲，且灌溉便利排水良好的砂質壤土或壤質砂土地。

(2) 栽培過綠肥作物或秋菸的後地應盡量避免使用。

(3) 表土較淺，含砂量過多，保水力較弱，高燥，高低不平，或灌溉不易的土地都應避免使用。

慎用有機氮肥

春菸所需要的肥料量略較秋菸為少，每甲地所需三要素比例約為：

砂質壤土	氮	磷	鉀
五〇	一〇〇	一七〇	一八〇
七五	二〇〇	一八〇	二〇〇

施肥法：除砂土或較壤砂地外，分為二次施肥。第一次於移植時作基肥施入，第二次於小培土時作追肥施入。如果所用氮肥為餅類及尿素時，應事先與腐熟堆肥混合，促使分解。

二月中旬移植

菸苗移植本圃，多在二月中旬舉行。通常在菸

苗最大葉長十二公分，葉數九片左右時即行移植。徒長苗、帶病蟲害的苗和畦邊的菸苗，都不宜採用。尤其是大型苗，移植後容易提早開花，着葉數又少，所以千萬不要採用。其他移植方法都和秋菸相同。

注意培土灌溉

春菸大小培土都和秋菸相同；但是大培土不必過高，溝面須平坦，略向排水溝方向傾斜，以防積水。

至於灌溉次數和水量，則須視土壤乾濕情形來調節。春菸本圃初期雨量少，菸株發育容易受阻，不但菸株外型硬化狹長，菸株矮小，且易提早發蕾開花，因此，本圃初期宜多灌水，經常保持菸株周圍濕潤，以促進菸株充分發育。

到了本圃中後期時，灌溉水量和次數都須逐漸減少，尤其發蕾後，必須等到菸葉顯著凋萎時，才可以舉行少量灌溉。成熟時尤應減少水分，以免影響菸葉成熟。

可安心使用
信用可靠

(中日牌)

劑劑劑劑劑劑
乳乳乳乳乳乳
農靈靈靈靈靈
達度利特松松
利速必安巴拉馬



廠址：臺中縣外埔鄉大同村甲后路一〇八號

豐年牌農藥

請認明豐年牌為
品質高超信用可靠之標誌



無臭米賜多

禾毒性殺蟲劑
蚜蟲，紅蜘蛛，剋星

富粒松乳劑

果樹、蔬菜害蟲防治

樂農家

薄荷、瓜類、蔬菜、豆炭
病類：銹病、露菌病、痘病

殺也特

薄荷、豆類、柑桔：
白粉病、象皮病

興農化工股份有限公司

臺中縣大里鄉內新路五九號
電話：二六一九、四六八八
臺北連絡處：臺北市仁愛路二段四六號
電話：三八八二六