



春播大豆應在立春後

【問】：一、春播大豆最早在何時？
二、臺大高雄一號大豆種子應向何處洽購？

三、臺大高雄五號大豆春作最早可在立春前播種嗎？（屏東市橋北里華月巷十號鍾炳堂）

【答】：一、春播大豆最早在立春後約一星期。
二、臺大高雄五號春播大豆適期為二月中旬到三月上旬。

三、臺大高雄一號及五號豆種可向屏東縣九如鄉公所建設課洽購。（劉文慶）

花生種可存八個月

【問】：本人在去年六月間收穫的花生種子，想儲存到今年春季下種大約經過七個月會影響發芽嗎？（南投鎮營南里二四四號鄭枝柳）

【答】：一、充分乾燥的花生帶莢成熟種子，在常溫放置於室內乾燥處時，在八個月以內還能保持正常發芽率。

二、儲存七個月後，為了確保產量，最好在播種前做發芽試驗。（蘇匡基）

油桐自然落果好

【問】：一、在樹上採取油桐籽或收集自然落果那一種方法好？

二、糖果剝皮機器何處有售？（花蓮縣新城鄉新城村二之七十八號蔡龍成）

【答】：一、在樹上採取油桐籽可節省工資和減少損失或盜竊。

二、收集自然落果，所有油桐籽都已充分成熟，含油率較高，母樹枝條不會受傷剝皮較易，也不會影響下年產量。

三、為了保持母樹枝條的完整，確保翌年的生產量和採油率。在工資低廉不會被竊收的地方，宜採用這方法較好。

四、購置糖果剝皮機器，可向中國生產力貿易中心接洽，地址在臺北市中山北路一段一八一號之六。（林景明）

根瘤菌粉劑有效果

【問】：一、接種根瘤菌粉劑向何單位索取？

二、該劑效果如何？（屏東縣新埤鄉打鐵村東興路三十六號林雄華）

【答】：一、大豆根瘤菌粉劑接洽種植請向臺中市國光路中興大學農學院吳敏慈教授洽取。

二、大豆播種時，用根瘤菌粉劑接種劑拌種，有顯著增產的效果。（劉文慶）

扁柏播種要設苗床

【問】：本人庭中栽有一株扁柏今年已經結實，兩月前有部份成熟，把子實撒佈在母樹四週，至今未見發芽，請問扁柏應如何播種和育苗？（臺南縣後壁鄉嘉麥村一一八號邱玉書）

【答】：一、扁柏種子成熟期約在十一月上旬發芽率僅約百分之八。

二、播種前先整理苗床，條播較慢，播種量每平方公尺約〇・〇七公升覆土不宜過厚以不見種子為度，

覆土後宜稍加輕壓並覆蓋稻草可保持苗床適度濕氣尤須架設蔭棚以免陽光直射，播後約二、三星期開始發芽。（林榮試驗所）



稻熱病的特效藥 預防兼防治，收穫保證滿意。

依照53年度植物保護推廣方法，防治葉稻熱病，穗稻熱病，各施用一次，提高產量，本輕利多。

農林廳登記農藥字 158 號

日農

シンタール錠剤

日農新米裕片劑（推廣手冊譯名，新美爾片劑）

農林廳登記農藥字 157 號

日農

シンタール乳剤

日農新米裕乳劑

- ◎可與其他殺蟲劑混合施用，節省勞力。
- ◎片劑即將在全省各鄉鎮農會供應農友。

進口現貨供應 **泰洋股份有限公司**

臺北市重慶北路2段108號 電話 44994號

製造廠

日本農藥株式會社

東京・大阪