

：種豬新廣推

藍瑞斯 杜洛克

·倫乃戴·

本省現有的外國豬種，一般人可能祇知道盛克夏，約克夏和漢百夏等三種。其實臺灣公司在民國四十九年六月間，又從美國引進了「杜洛克」和「藍瑞斯」兩個新豬種。現在已經繁殖了不少，都是繁殖三品種豬很有希望的種豬之一。

最近幾年來，凡會到過苗栗縣竹南鎮頂埔里壠糖公司種畜場參觀的，不但都見到了這兩種新豬種，而且都覺得有濃厚的興趣，尤其是杜洛克豬，因為牠

的毛幾乎全部呈棕紅色，更加為一般農友所喜愛，

杜洛克 (Duroc) 這是在美國東北部從當地的紅毛豬和

杜洛克豬屠商歡迎

其他紅毛系雜交繁殖而成的，過去這種豬在美國飼養也並不普遍，但是因為生長發育很快，抗病力強，母性和繁殖力都很優良，加之又能適應各種氣候，因此很快就遍及各地區。目前美國飼養杜洛克豬隻，已經能在生後滿五個月的體重達到九十公斤，成年公豬可達三百至四百五十公斤，母豬可達二百七十至三百十五公斤。

近年來本省用牠和一代雜種母豬雜交繁殖三品種充作肥豬飼養，不但增加體重，飼料的利用情形也都很好，而且在運銷市場上很受到一般屠商的歡迎。

藍瑞斯種繁殖力強

藍瑞斯 (Landrace) 這種豬是在丹麥經過幾十年的選種而成的一種新豬種，身體特別長，白毛長得很快，飼料利用率高，背部拱起，頭長稍狹，耳朵大而可以掛到臉側，臀部豐肥，後腿發達，母性溫順，繁殖力強，目前歐美許多國家都有飼養，由於屠儼品質的確良好，所以也是目前相當受人歡迎的豬種之一，通常成長的公豬，體重可達三百至四百公斤，母豬可達二百五十五至三百四十公斤。

在本省飼養觀察的結果，除了需要給以適宜的飼養環境和良好的混合飼料以外，在夏秋季節還是要設法經常保持豬舍的涼爽，用牠和一代雜種母豬繁殖三品種豬隻，亦格外能受到市場的歡迎。




杜洛克種公豬(上) 種母豬(下)


訂正：第三期十一頁「照顧小豬」文內「小豬生後三十八天去勢」應改為二十八天。

祝君新春大發財

龔君文
中禾圖



，知所可開特
，排安要一活生天
。來年一了完年一




，我主無虛活生
，夜解日時費浪命生
。 (老格資) 牌老上富豐意生



，在的過爬牛
，來路路綠生人
。 (惜可) 來，載十數世一白空

藍瑞斯種公豬(上) 種母豬(下)



預防雞的

食毛癖和食血癖

· 季培元 ·

雞喜歡食毛和食血是一種惡癖，無論是肉雞和蛋雞影響都很大，必需在雞的時候就預防。

惡癖影響

雞羣中常常有相互啄食羽毛和食血的習慣，這種現象可能是因為雞羣擠在一起，開始時吃飽了沒有事相互啄食羽毛，羽毛被啄後甚至使毛根部位和皮膚流血，引起其他的雞來吃，以後就漸漸養成食毛及食血的惡癖了。

雞隻因掉毛流血，生長和產卵都會受影響，肉用雞則因外觀不好減低售價，損失都很重大。預防這種情形的方法很多，本篇先介紹一種雞嘴去除法，是利用剪刀剪除雞嘴的一小部分，根據試驗結果，雞嘴經剪除一小部分後，飼養成績要比沒有剪除的好。而且工作起來也方便。

除雞蛔蟲用「比配拉仁」

【問】：小雞有蛔蟲，服用「牛落安」後迷了好幾天，不知什麼原因？(臺南縣六甲鄉甲南村五百十五號校利)

【答】：一、家畜和家禽的驅蟲藥物不同，同時對寄生蟲藥效亦有差異，千萬不要亂買成藥為要。你的雞隻死亡，可能用錯了藥的緣故。

二、關於雞蛔蟲，應用「比配拉仁」(Piperazine) 效果很好，每公斤體重用量為〇·三公分。(李登元)

剪除雞嘴

雞出生後一天，是剪除雞嘴的適當時期，或者在雞十至十四天時施行亦可，所用剪刀必須選用很銳利的，且須注意不要傷害雞的舌、顎等其他部位。剪除雞嘴的方法有三種：

(一) 雞嘴上下兩片各剪去三分之一長，這適用在大規模的雞場可以節省人工。


(二) 雞嘴上方剪去三分之二長，這種方法較為費工，只適用在小規模的養雞場。

以上兩種方法都是適用在初生二十四小時以內的雞。

(三) 雞嘴上方剪去三分之一長，下片只剪去少許，這種方法費工亦較多，僅適用於十至十四天的雞。

實施剪除雞嘴時是用左手抓着雞，右手拿剪刀，剪的時候要使雞嘴的邊緣非常平整。


雞的嘴被剪以後開始時可能採食不方便，但不久以後就會成習慣的。



反省充聞時
過實可惜
去白費時
來未是愛
來好是愛
(事好) 代知理
。該應



春立青
天志消
到來未
可與缺
愛悲(會)代
，哀不時
，來返



朋友自珍
兄弟青君
報國新春
，知謹勸
，說境新
！財發大