

適宜土性

當歸最適宜在排水良好的砂質壤土栽培。粘土地土壤硬固，會阻碍根部伸展。相反地，砂質地過於輕鬆，容易發生許多細根。

夏季雨量多，栽培地的排水很重要。因為排水不良會使根部腐敗，發生缺株。

適宜地點

夏季的高溫和降雨是當歸生長的一大阻碍，所以栽培當歸，必需慎重地選擇有遮蔭，便於取水的位置，並且採用高畦，施行畦面覆蓋，保護生長。適於栽培當歸的地點是：(一)防風林的旁邊，上午有陽光，下午會成蔭。(二)菜園籬笆旁邊，通風良好的地方。

播種方法

一、航家庭栽培，生產自家用當歸，因為面積較小，宜採用直播方法。播種要領如下：

- 一、設畦寬九十公分，另寬三十分，做成二一至二十四公分高畦。
- 二、土壤用「烏斯普龍」等水銀劑五百倍液殺菌消毒，再用「阿特靈」五百倍液殺除土壤害蟲。
- 三、每畦播二行，行間四十公分，株距十八公分，一公畝地(一厘地)播種九百二十處。
- 四、一公克種子約有三百五十粒，每處播五粒，可以播二·五坪。
- 五、播種前將種子浸於攝氏四十五度的溫水一天，陰乾到種子能散開後播種。

六、在播種處，用手指描成直徑

六公分，深〇·五公分的平底圈，在圈裏散播五粒種子，蓋上〇·三公分厚細土，然後用手掌輕輕壓，並小心澆水後覆上稻草，促進發芽。平底圈切勿做得過深，以免土粒堆積阻碍發芽。

肥培管理


當歸種子在播種後二星期開始發芽，發芽整齊後，勵行澆水、除草、中耕，使當歸苗生長良好。

在幼前期宜經常澆水，使土壤保持相當水份，並用稻草片覆蓋畦面以抑制雜草生長。

五月間舉行間拔，每處留一、二株。間拔時先用移植鏟從四週鏟鬆土壤，小心取苗，不要損傷根部，立即移植他處。

氮份過多時，會使當歸莖葉繁茂，所以，不宜多施硫酸或尿素。每月中耕後，每二·五坪地用過磷酸鈣和氯化鉀各二十公克加入豬糞中做追肥施下。

平地當歸需要遮蔭保護。在畦上用竹子架設六十公分高的竹架，竹架上用九十公分寬的竹片簾(竹片寬一分，用鉛線編成簾)遮蔭保護。混種蔓性豆類，設架遮蔭當歸亦可，但應注意豆類害蟲侵襲當歸。竹片簾自五月底使用。



法方的歸當種園菜

農復會、農林廳、糧食局提倡推廣
最新防治稻穀雜糧儲藏害蟲用藥

保滿丹粉劑5%

“解決倉庫內積谷害蟲 減少產品貯藏損失”



“一公斤保滿丹可抵4—6公斤靈丹粉，沒有靈丹粉對人畜的毒性 比靈丹粉殺蟲効力更強。”

	保滿丹	靈丹
①殺蟲力強，對人畜毒性低(比靈丹粉低一百倍)	12900mg/kg	125mg/kg
②有效期間長(比靈丹粉長2—3倍)	6個月	2—3個月
③使用倍數高(為靈丹粉的二倍)	1500倍	800倍

“使用方便 不須特殊勞力 價錢便宜 利潤高”

據臺南區農業改場報告：每1500公斤甘藷竅用一公斤保滿丹，可增加500元的收入。



發財農藥
品質保證
恭禧發財

保滿丹粉劑5%

亞洲化學股份有限公司

臺北市重慶南路一段54號三樓

電話：31994·23754

全省各地鄉鎮農會均有代售