

**種子消毒各有不同**

小麥生育一百多天

二四-D可殺雜草

【問】：一、水銀波爾多液可否兼作種子消毒用？份量多少？如用大生、福爾馬林消毒種子可以嗎？

二、小麥種子何處有售？每分地播種量和產量各若干？

三、有何除草劑可殺死羊齒類雜草？（臺中和平志長周啓民）

【答】：一、水銀波爾多液不能作種子消毒，僅限代替普通的波爾多液做撒佈用。福爾馬林可用於種子消毒，如稻種消毒用六十倍，三十分鐘，如蔬菜種子用一百倍，三十分至一小時。

但一般用谷仁藥生加水浸漬種子或把乾粉混拌種子都可以用，殺菌力強，可在短時間內消毒完全但稍有藥害。蔬菜種子可用烏斯普龍、利歐珍、裕米農等藥劑，大生是撒佈用的藥劑，種子消毒未曾用過。

二、小麥種子，若少量可請臺中改良場分讓，但要等到本期收穫後才有種子，播種量每分地約六至八公斤，每分地產量普通約一百八十至二百四十公斤。最長的生育日數一百二十五天。

三、二四-D可殺死羊齒類雜草，但現在缺貨不容易買到。（林藏生）

**大豆低溫不結實**

【問】：我在去年第二期稻作收割後即播種大豆但今發現全區五分之四沒有豆仁是病害嗎？（高雄縣燕巢鄉瓊林村二十七號趙松根）

【答】：秋作大豆結實不飽仁的原因，不是病害，大概是所用品種不適合秋作，即不耐低溫，或晚播的關係。（劉文慶）

**春蔗二月為宜**

【問】：一、春植甘蔗行株距需多少？二、在臺東栽植何品種為宜？三、可宿根幾次？

四、春蔗適於何時種植？可否間作？（花蓮天祥西寶農場李達欽）

【答】：一、春蔗行距是一·一至一·二五公尺，每公頃密植四萬苗為原則。

二、目前適合春植優良蔗種是下四八。可向附近糖廠訂苗。

三、可宿根一、二次，次數越多，產量越低。

四、春蔗二月為宜，可依照地方情形決定間作的種類。（伍文耀）

**當歸管制進口**

【問】：一、如何識別純大和種當歸？二、五十一年十月底播種，五十二年三月中旬定植的當歸幾天可採收？

三、調製加工法，照本刊十二卷廿二期所發表的是否可靠？

四、今後的國際市價是否穩固？（宜蘭縣三星鄉萬富村一〇一號廖德欽）

【答】：一、大和當歸的莖色是綠中帶紫，有明顯縱溝，葉互生，二至三、四奇數羽狀分裂，邊緣有細齒，小葉三對對生，卵形或菱形，呈一、二回分裂，裂片邊緣有深齒裂。

二、五十二年三月定植的當歸十二月採收為佳，不要抽苔開花，否則品質變壞。

三、本刊前載加工法可參考，最近本人發表的調製加工法品質較好。

四、當歸自十月份起開始部分管制，限從韓國進口，目前生產量僅可供內銷。（楊永裕）

# 藥農正

**美果素乳劑**

防治：柑桔、李、梅、桃、荔枝之捲葉蟲

**地特松水溶粉劑**

防治：螟蟲、蚜蟲之特效藥

**多穗**

是紋枯病之特效藥

**螻蛄必死誘殺餌劑**

防治：螻蛄，蟋蟀之剋星



商標

註冊

正豐化學股份有限公司

臺中縣 霧峯 電話六三號

**綠寶銅可濕粉劑**

防治：稻熱病，果樹病害


**鐵地旺**

粉劑

是紅蜘蛛之剋星

**益加津乳劑**

防治：李、梅、桃、荔枝之捲葉蟲



生在臺北有收購

【問】：一、省產地何時可採收？  
二、格價若干？有地方收購嗎？收購前必加加工嗎？（彰化縣竹塘鄉土庫村東陽路十九號解瑞深）

【答】：一、生地在植一年後在開花前採收最經濟。臺北市中藥商行收購較多每公升約卅元。二、出售前需加工。（楊水珍）

本省產大和種當歸

【問】：一、中藥的當歸有幾種？  
二、本省所產中藥當歸經銷商號有幾家？在那裏？  
三、本省當歸品質如何？（臺北市三一七號信箱鮑千里）

【答】：一、當歸品種有兩種正品種：①我國秦嶺山脈的秦歸。②日本大和當歸。二、本省除知本農場和中國藥物開發公司種的是大和品種外其他地方的品種已亂。三、日本大和歸在日本種不好，本省移植後品種遠勝日本產品，形態和大陸歸相同。（張禮文）

甜菜適於秋植

【問】：一、甜菜栽培季節是何時？  
二、甜菜要移植嗎？行株距多少？  
三、甜菜的用途如何？  
四、甜菜適於何種土質每分地需種子多少？（雲林縣水林鄉溪墘墘一號陳茂雄）

【答】：一、甜菜栽培適期是九月至十一月。二、甜菜一定要直播，畦寬一公尺播兩行，經兩次間拔後的株距是七至十公分。三、甜菜適於煮食銷路不大。四、適於排水良好的砂質壤土或壤土栽培，生長期七十至八十天，每十公畝的播種量約十公升。（王進生）

栽培油菜苗齡要短

【問】：一、油菜的苗齡要多久？  
二、土壤較濕地區可以種嗎？  
三、油菜施肥量需多少？（臺中縣霧峯鄉坑口村中正路二三號王玉柱）

【答】：一、苗齡以二十五至三十天的苗最好，苗床面積不要太小，以免徒長且要實施間苗。二、移栽時土壤過濕者率很低，因此濕地栽培要注意排水。三、油菜每十公畝所需肥料是堆肥五百公斤，硫酸銨六十公斤，過磷酸鈣十五公斤，氯化鉀十二公斤，施肥時期亦需提早，使種子提早成熟。（林漢生）

腰果怕低溫


【問】：腰果樹容易栽培嗎？（花蓮縣玉里鎮春日里七十二號張雙得）

【答】：腰果樹在嘉義農業試驗分所栽培的結果如下：①幼苗入冬過低溫就會枯死。②成年樹遇到霜害，大小枝條部份枯死，也有全株枯死的。③二十年以上的腰果植株可以開花，但不結果。

果苗進口需經檢疫

【問】：一、目前擬向國外購買果苗，據說不能匯款，是否可請貿易商代為匯購？  
二、如在國外的朋友郵寄果苗，海關是否可通過？（南投鎮彰南路一九八號劉寧顯）

【答】：一、輸入果樹苗依照規定除特殊植物如甘蔗、鳳梨、茶、咖啡、香蕉等種子種出和香蕉苗、柑桔苗兩項，外實已列為管制進口貨品，並須施行隔離栽培外，其餘可照一般貨品輸入方式進口。二、進口時，須向所在地本局檢驗所報請檢疫合格後，憑合格證向海關提貨。旅客攜帶或航運植物數量在十公斤以下的報請檢疫時不收任何費用。（臺灣省檢驗局）



品質高超 信用可靠之標記

請認明 拜耳商標是

地特松 粉水 劑溶

低毒性殺蟲劑!!

力拔山乳劑

現貨供應：正豐化學股份有限公司

臺中縣 霧峯 電話63號

臺灣總代理：中德貿易有限公司

臺北市博愛路98號

電話：33157・33158・33159

可安心使用 信用可靠

(中日牌)

劑劑劑劑劑劑  
乳乳乳乳乳乳  
農靈靈靈靈靈  
達度利特拉拉  
利速必安巴馬



廠址：臺中縣外埔鄉大同村甲后路一〇八號



**羊寄生蟲服「牛豬安」**

瘦是否有寄生蟲？用何藥物可治療？

一、何處有買Hexachlorethane或Phenothiazine（飛納賽淨）（臺東縣瑞鳳鳳梨農場吳秀全）

【問】：一、你的乳羊，突然消瘦下去，除了患寄生蟲病外，可能還有胃腸方面的疾病，尤其生產後，飼養管理不周到時常會引起其他慢性的疾病，為安全起見，最好請比較有經驗的獸醫檢查一下。

二、所問Hexachlorethane及Phenothiazine目前在臺灣可能不容易買到，前者是治肝蛭，後者是治回蟲類的藥品，這些藥不能在農藥店購買，不小心反而有害。

三、請到臺南市復興路元山化學公司購買「牛豬安」，是德國拜耳藥廠出品，對山羊的一般寄生蟲都有效。（黃立羣）

**飼養母豬要肥瘦適當**

【問】：一、如何提高母豬產子量？

二、母豬受孕前後用何種飼料？  
三、如何能保持子豬均勻？（新竹縣新豐鄉埔和村一號黃培林）

【答】：一、欲提高母豬產子量，經常應優良質飼料，使母豬不太肥也不太瘦，最好一次發情配兩次，生產頭數較多。

二、應備富有蛋白質的良質飼料。

三、如欲保持仔豬發育均勻，與母豬時注意乳頭的數目和形態的整齊，哺乳數最好為十頭，多餘的給其他母豬哺乳，小豬剛出生時就宜剪牙，否則無意中會把母豬乳房咬破，發生乳房受傷或乳房炎，乳豬的發育就不整齊。（張聯欣）

小啓：許萬得農友請速補地址以便回信。

農業信箱來信，請用雙聯明信片，或來信中附寄回信郵票。

**增加你的收入!!**

▲興農春播包心白菜：一兩六〇元

▲興農三季甘藍：一兩八五元

▲興農初夏一號甘藍：一兩八五元

立春後開始播種栽培至夏天收穫均能耐高溫的最佳新品種

贈送試種附郵一元函索即寄

**請參閱 興農園藝新知識**

輸入元林興農行股份有限公司

**興農種子行**

本行 臺北縣三重市重新路三段一〇八號

電話：九七一一二六三四

副撥儲金四〇二八號

連絡處 豐原鎮中山路二八二之一號

註冊商標：中臺字11648號



植物生長促進細胞賦活劑  
世界聞名最新特效農藥



液劑

製造：日本旭化學工業株式會社  
總代理：臺寶貿易股份有限公司  
臺北市太原路44號 電話：45437 41119



保證品質  
廉價供應

增收的原動力  
提早收穫  
改善品質  
防止病蟲害

**請使用賽文50%可濕性粉劑防治**

(一) 茶葉害虫

茶避債蛾

茶浮塵子

小白紋毒蛾

茶捲葉蟲

(二) 柑桔害虫

柑桔角肩椿象

介殼蟲類

總代理 福美行  
總經理 臺南市南陽街46號  
總批發 興農化工股份有限公司  
臺中縣大里鄉內新路59號

**農作物增收劑 木オゲン**



綜合微量要素葉面液市用



臺灣總代理 豐裕農藥行  
員林鎮民生路230號 電話583號

◎效果良好  
①水稻：秧苗健育，預防倒伏。  
②果樹：早期多收，防止落果。  
③蔬菜：增加葉綠素，提高收穫量。  
④茶葉：樹體旺盛，增加產量。  
⑤花卉：強壯，收量增加。  
日本農林省登錄生藥第一號