



**種子消毒各有不同**

小麥生育一百多天

二四-D可殺雜草

【問】：一、水銀波爾多液可否兼作種子消毒用？份量多少？如用大生、福爾馬林消毒種子可以嗎？

二、小麥種子何處有售？每分地播種量和產量各若干？

三、有何除草劑可殺死羊齒類雜草？（臺中和平志長周啓民）

【答】：一、水銀波爾多液不能作種子消毒，僅限代替普通的波爾多液做撒佈用。福爾馬林可用於種子消毒，如稻種消毒用六十倍，三十分鐘，如蔬菜種子用一百倍，三十分至一小時。

但一般用谷仁藥生加水浸漬種子或把乾粉混拌種子都可以用，殺菌力強，可在短時間內消毒完全但稍有藥害。蔬菜種子可用烏斯普龍、利歐珍、裕米農等藥劑，大生是撒佈用的藥劑，種子消毒未曾用過。

二、小麥種子，若少量可請臺中改良場分讓，但要等到本期收穫後才有種子，播種量每分地約六至八公斤，每分地產量普通約一百八十至二百四十公斤。最長的生育日數一百二十五天。

三、二四-D可殺死羊齒類雜草，但現在缺貨不容易買到。（林藏生）

**大豆低溫不結實**

【問】：我在去年第二期稻作收割後即播種大豆但今發現全區五分之四沒有豆仁是病害嗎？（高雄縣燕巢鄉瓊林村二十七號趙松根）

【答】：秋作大豆結實不飽仁的原因，不是病害，大概是所用品種不適合秋作，即不耐低溫，或晚播的關係。（劉文慶）

**春蔗二月為宜**

【問】：一、春植甘蔗行株距需多少？二、在臺東栽植何品種為宜？三、可宿根幾次？

四、春蔗適於何時種植？可否間作？（花蓮天祥西寶農場李達欽）

【答】：一、春蔗行距是一·一至一·二五公尺，每公頃密植四萬苗為原則。

二、目前適合春植優良蔗種是下·一四八。可向附近糖廠訂苗。

三、可宿根一、二次，次數越多，產量越低。

四、春蔗二月為宜，可依照地方情形決定間作的種類。（伍文耀）

**當歸管制進口**

【問】：一、如何識別純大和種當歸？二、五十一年十月底播種，五十二年三月中旬定植的當歸幾天可採收？

三、調製加工法，照本刊十二卷廿二期所發表的是否可靠？

四、今後的國際市價是否穩固？（宜蘭縣三星鄉萬富村一〇一號廖德欽）

【答】：一、大和當歸的莖色是綠中帶紫，有明顯縱溝，葉互生，二至三、四奇數羽狀分裂，邊緣有細齒，小葉三對對生，卵形或菱形，呈一、二回分裂，裂片邊緣有深齒裂。

二、五十二年三月定植的當歸十二月採收為佳，不要抽苔開花，否則品質變壞。

三、本刊前載加工法可參考，最近本人發表的調製加工法品質較好。

四、當歸自十月份起開始部分管制，限從韓國進口，目前生產量僅可供內銷。（楊永裕）

# 藥 農 豐 正

**美果素乳劑**

**地特松水溶粉劑**

**多 穗**

**螻蛄必死誘殺餌劑**

防治：螻蛄，蟋蟀之剋星



商標

註冊

正豐化學股份有限公司

臺中縣 霧峯 電話六三號

防治：柑桔、李、梅、桃、荔枝之捲葉蟲

防治：螟蟲、蚜蟲之特效藥

是紋枯病之特效藥

**綠寶銅可濕粉劑**

**鐵地旺**  
粉劑

**益加津乳劑**

防治：稻熱病，果樹病害

是紅蜘蛛之剋星

防治：李、梅、桃、荔枝之捲葉蟲