



儘量 提早

期乳離的猪仔

通常仔豬的哺乳期是五十六天，如果能把這哺乳期儘量的縮短，養豬的農友們會有很多的好處。

根據試驗結果，母豬的哺乳期已有辦法可以縮短到十四天，但這需要很好的設備和管理才能成功，一般農友們比較行得通的。是在二十五天起或三十五天後開始離乳較為適宜。

母豬的產乳量，一般到了產後二十天左右，已達最高峯，以後乳量就漸漸地減少了，那時如單靠母乳中獲取營養，也不能使仔豬發育到最快的程度。

提早離乳一年兩胎

雖然小豬提早離乳，要增加一筆支出。以一窩八頭仔豬，從開始給料起算到五十六天，飼料消耗約五十多公斤。但這是最有利的投資，因為在這段時期裏，根據有人一年來飼養盤克夏純種豬的經驗如下：

- (一) 飼料利用效率最好可高達二·二，就是長一公斤豬肉只要二·二公斤的飼料就可以了。
 - (二) 每頭仔豬八週齡時可達十四公斤半以上，假如用自然哺乳，平均每頭只有十公斤左右。
 - (三) 提早離乳的母豬一年可生產兩胎，但自然哺乳的只能生產一胎半；這是因為縮短了仔豬的哺乳期，相對的提早了母豬發情配種的時間。
- 飼仔豬生長都很平均，可同時出售。

自己可以配人工乳

人工哺育仔豬最重要的事，是如何配合一種適合於仔豬，而且在營養方面可以接近或完全代替母乳的飼料，一般稱為人工乳。我們所使用人工乳混合飼料的配方如下：赤糖四·四、酵母二、麵粉十八、玉米四十、魚粉八、甘藷六、大豆粉十五、脫脂奶粉四、食鹽〇·五、歐羅肥〇·二、骨粉一·五、維他命〇·二、表百新〇·二，以上合計是一百。總之混合飼料要含粗蛋白質在百分之二十至廿二之間，纖維含量要少。

配合飼料時首先應注意微量成分，如歐羅肥、表百新、維他命、骨粉等須另外配合均勻。其次是把成分較大的要先混合均勻後磨成粉狀，特別是黃玉米必須磨得很細，然後取其中的一小部份，和微量成分混合均勻後再和其餘的全部混合，這樣可以避免微量成分的拌和不均，影響到飼料的效果。

選購飼料時要注意品質，不要買不新鮮的飼料，尤其是魚粉要選用最好的，或者買魚干，

綠化寶島留名聲！

龔君文 中禾圖



賀綠島山民生計苦
真林愛岸
名拍影
拆知(哭平)
(力努)拆知(哭平)
(驚免無)

，頭山是央中灣臺
，針針針披山(邊兩)平兩
(筋腦傷)疼就頭林邊無那
!命救喊海倒山移

，命性(如)那省本林森
(務之要首)影卡木林設盜
(紳取)勳會龍能俠盜
。廳官送時隨去(抓)劫