再磨成魚粉比較可靠。

飼料抹嘴讓它舐食

如果計劃在仔猪生後二十五天就完全和母猪隔開，改餵人工飼料的話。要在仔猪生後第十五天，就開始使用教槽，使仔猪習慣食用混合飼料。

訓練教槽的方法是用左手捉住仔猪頸背近耳根處，用右手食指把飼料抹在仔猪嘴唇上，讓牠舐食，如此調教二、三次後，仔猪即知甜美可口喜歡吃了。等到成習慣以後，可以把飼料經常放在飼料槽裏，但飼槽的深度此時以不超過二寸爲宜，同時離乳後的仔猪還是和母猪關在一間時，在仔猪的飼料槽上要加柵欄，使母猪吃不到仔猪的飼料。

仔猪離乳前一星期，母猪開始減料，到離乳當天母猪要完全斷食，只給它清水。離乳後再漸漸恢復飼料量，以防發生乳房炎。

清水嫩蔓土塊稻草

仔猪除供給充足的飼料外，還需要給它清潔的水，但放水的位置要離開飼料遠一點，以防仔猪吃一口飼料隨即吃一口水便容易下痢。

每天要餵仔猪少許青嫩的甘藷蔓，補充維他命的不足。

在猪舍的後面要經常放一些新鮮的土塊，讓仔猪隨便舐食補充鐵質。

爲了訓練仔猪及早會吃飼料，也有在生後十天，就開始給仔猪飼料的。

但是在早期離乳沒有把握以前，農友們可以先實行四十二天離乳，等到有了經驗以後，再提早到三十五天離乳，如此不致遭遇到太大的失敗，否則就得不償失了。

飼養早期離乳的仔猪欄，更要保持清潔乾燥和溫暖，冬天氣候寒冷時，猪舍裏要墊乾草，必要時要用電燈保溫以防凍死，一欄放一窩猪，不是同一窩的仔猪，最好不要關在一起。

編者：本文是根據簡明龍和謝祖澄兩位先生所供給的資料編寫的。

* * *

猪飼料中加酵母發酸粉有什麼効果

酵母是酵母菌經大量培養或在釀造啤酒、酒精時的殘滓經乾燥後磨成的粉。含有粗蛋白質百分之四十至五十、二十多種的氨基酸、豐富的維生素乙複合體、礦物質和少量的維生素甲、丁等。有幫助消化的作用消化率可達百分之九十以上。

對於消化機能的障害、食慾減退、脚氣、神經炎等有很好的治療效果。並且有促進發育、預防發生脚氣病和皮膚病等的功用。酵母可以代替各種飼料中的蛋白質飼料，但是因爲酵母的價錢太貴，普通僅宜使用全飼料量的百分之五至十爲度。

酸粉的主要成分，大都是重炭酸鈉就是小蘇打，重炭酸鈉稍有鹼性，在胃腸內可以和異常醱酵所過剩的酸中和，把有害的物質排出腸外，而且可以減少血液中的酸度相對的增加血液裏的鹼度，所以有促進新陳代謝的作用，增加膽汁的分泌，幫助消化作用增進食慾，對慢性胃腸疾患，經常性的便秘、風濕症、結石和其他中毒等方面都有很大的藥效。

一般的用量是中猪每天〇•五至一公克，小猪每天〇•三至〇•五公克。（張聯欣）



，正義意日節樹植
，食衆咱樹種人前
，拚拍着人先法效
。聲名留島寶化綠

，聲名好林造樹植
，（要重最）件一頭持保土水
，（力努）拚拍着業工應供
！聲名好闖又錢趙

，驚人人哭火林山
，（人壞）于歹是山燒火放
，（道知）影知愛意注（苗火）星火
！（樣糟）痛哭就意大忽疏