

好做樣怎

菸葉的調理工作？



連錦昆

選擇調

排適當的調理日期。一般在繳菸前十日至二星期開始調理，而於繳菸前三日左右完成包捆工作為佳。

理場所

調理工作最好是在合於公賣局規定的菸葉調理室內舉行，如不可能，亦應選擇窗向北開、整日光線較為穩定以及門窗可以緊閉的場所，內置調理架（高約二·五臺尺左右）及坐椅，以提高工作效率。

依次進行調理

烤乾的菸葉，在繳交菸葉廠前，一定要經過一個調理階段，即依據葉片的顏色、厚度、長寬度、香味、彈性及完整性等，分別的綁把及捆包，而後廠方才能決定它的等級，付給合理的價錢。

怎樣作好菸葉的調理工作？謹參照公賣局規定事項及一般經驗，扼要地提出數點，以供各位參考。

安排調理日期

廠方在收購菸葉前，會通知各位，菸葉何日收購及其數量。各位在接到通知後，可參酌自家的勞動力，可交換的人工數，可雇到的技術工和臨時工，氣候變化以及工作效率等，安

調理時，一定要依據葉位順序，由天葉下至土葉，或由土葉上至天葉，分初選及複選二階段進行。

初選：初選俗稱分「黃黑」，可由普通工人擔任，打開菸包後，依葉片顏色及受損傷程度，將黃色葉、青色葉、紅色葉、褐色葉、傷害葉及不同葉位葉等分開，遇到葉柄帶有莖皮或腋芽者，隨手摘除，葉面上局部斑塊，最好亦予剪除。

複選：一般由技術工人擔任，將初選過的菸葉，予以更細的分類，如黃色葉中再分為檸檬黃、金黃及淺黃色等，同時根據葉片的長短、寬狹、

政府登記 合格農葯



葯農牌年豐
興農化工股份有限公司

台中縣大里鄉內新路五九號
電話 二六九 四六八八

15% 3% BHC 粉劑
65% BHC 可濕性粉劑
賽文粉劑
稻熱病葯劑
(西樂生石灰)

魚臭米賜多乳劑
富粒松乳劑
依必安乳劑
賽文可濕性粉劑

厚薄、香味及彈性等，將外形及品質完全劃一的菸葉集在一起，遇到品質特別優良的菸葉，應將葉面展開，注意有無病斑。

假綁：複選完成的菸葉，可交由普通工人，利用乾稻草或麻片，約每二十至三十葉疏鬆地綁在一起，堆積於適當位置。

許多菸農習慣上都是不經過假綁階段，複選後即用濕菸葉綁把，致於把頭發霉及葉色變劣，這是急待改正的。

初選、複選及假綁工作是同時進行的，一般如由二人初選，約需三至四人複選，另一至二人假綁。

綁把及捆包：全部菸葉複選及假綁完成，約於繳菸前三、四日，即可進行綁把及捆包工作。取出假綁菸把，再檢查一遍，剔去外形及品質不一致葉片，而後從中抽出一葉，摺成一英寸寬，將菸把綁緊。全部綁把完成，即可進行捆包工作，將外形及品質相同的菸把集在一起，厚葉約二十公斤，薄葉約十五公斤，利用牛皮紙捆包，捆包紙上註明厚薄、等級及繳交順序，以待繳納。

應該注意事項

(1) 預防吸濕：菸葉容易吸濕。

在本省，當歸可以分爲春秋兩次播種；春季播種最適期是三月間，請農友們不要錯過時間。


平地種當歸

好，適於春季播種，有意庭園自用或副業栽培的，請看上期十六頁專文。

三月最宜

又新竹區農業改良場五峰分場，在農復會的指導和補助下，採收當歸大深種種子十多公斤。這批種子發芽

省產種子 開始供應



把菸的準標

烤乾菸葉，在相對濕度六十多時，含水量約十一·五%，隨空氣中相對濕度的增加，菸葉中含水量亦漸增，如含水量超過十五多時，即有發霉及使葉色變劣的危險，因而影響菸葉品質。

(1) 爲預防菸葉吸濕，不論在貯藏間、調理室或捆包場所，菸堆下面一定要鋪墊一層塑膠布、麻袋、草蓆或稻草等，其上並以麻袋或塑膠布蓋緊，門窗開關更應隨時注意調節。

(2) 初選時，如發現葉柄或葉肉部份已發霉，應將之剪除，或用毛刷刷去霉菌，並用木炭火將發霉部份緩緩烘乾，切勿置之不理，或曝曬於太陽光下。

(3) 綁把用於菸葉，一定要用同等級的乾葉，把頭內切勿夾入中骨或碎屑等。以上是調理菸葉的幾個要點，假如菸葉調理不清楚，高級葉和低級葉混雜，廠方以低級葉論價，吃虧的還是各位菸農朋友。又最近數年，有不少外國菸商來本省購買菸葉，均因菸包內菸葉駁雜不純，而一再挑選，增加廠方很多麻煩。前年銷往西德的桶菸，抵達目的地後，八成以上菸把頭發霉，影響商業信譽至大。所以，菸葉產量及品質，雖然在田間及烤菸階段已經決定，但如調理工作未作好，還是會影響到各位的收益的。(木文標題照片 鮑國琛攝)



藥特效病熱稻

サンミクロン 乳劑

(純美谷農乳劑)

特點：效能長久，可與各種農藥混合使用，乳化特別優良，效果勝過片劑加倍。



農林廳登記 第70號

- 毒線蟲 • 開路生 • 大生22 • 大生78 • 可利生 • 快滅松
 - 新米隆 • MAC (防腐劑) • 殺也特 • 好寶粉 • 益加津
 - 加米達 • 其他國外名廠出品之各種農藥
- 散粉器 (粉粒兼用) • 杓型噴霧器

直接進口供應 惠光貿易有限公司

臺南市東門路 140 號 電話：4971號