

**水稻增產有要訣**

最好？

【問】：一、水稻的有效分蘗數，幾本最好？

二、如何增進水稻的有效分蘗數？

三、目前在南部種植的水稻品種那一種產量最高？(雲林縣元長鄉下寮村九號吳瑞福)

【答】：一、水稻最適宜的分蘗數第一期作約十八支，第二期作約十六支。

二、稻種剛行運種，秧田精細整地，每坪疏播四臺合，苗草葉粗大高五寸為佳，木田整地精細，淺插，施肥三要素配合要良好，生育初期實行淺水灌溉，促進早期分蘗。

三、據試驗結果臺南一號產量最高，第一期作五、一九九·三公斤，第二期作四、〇九〇·四公斤。(莊西路)

**東部可種 F-152 甘蔗**

【問】：一、F-152 甘蔗在東部山坡地可以種植嗎？何時為宜？

**胡麻成熟期有三種**

二、F-152 蔗苗在東部可有分讓？每株價多少？(臺東部蘭農場四二組王雲洲)

【答】：一、F-152 秋植甘蔗八月最適合，七月種也可以，勿延到九月後，春植蔗二月為佳一月種也可以。山坡地如水澆可解決可以試種。

二、東部地區 F-152 蔗苗很難買到，可向糖廠訂約請求供給，目下賣的每支一角，低的也需七、八分。(伍文耀)

【問】：本省有何優良的胡麻品種？(菲律賓華僑陳才順 陳富強)

【答】：胡麻優良品種，在本省尚在試驗期中，但胡麻的成熟期可分三種：早生種

**紫蘇一個月便可收穫**

【問】：一、青紫蘇宜在何時栽培？

二、何時可收穫？三、甲當施肥量和肥料三要素配合量各如何？四、有人收買否？

五、從播種到收穫的栽培法請指教。(員林鎮南平里南平巷五號賴弄毛)

【答】：一、紫蘇的播種適期是二、三月。

二、播種後一個月即可開始收穫，一直

到十一、二月間。

三、每甲地種植前施堆肥一萬公斤，硫酸銨二百公斤，過磷酸鈣六百公斤。播種後二十天施第一次追肥，用硫酸銨一百公斤，氯化鉀八十公斤。四十天後施第二次追肥，用硫酸銨一百公斤，氯化鉀一百公斤。

四、紫蘇多為加工或做香料，用量不多，少數加工廠可能收購。

五、紫蘇可採播或直播，畦寬一·二公尺種兩行，株距約四十公分。(譚靜吉)

**鐵針樹可以作圍籬**

【問】：一、本省北部可種鐵針樹作圍籬嗎？

二、種子何處可買？(臺北縣土城鄉員林村四一號之四姜坤賢)

【答】：一、本省北部地區可種鐵針樹作圍籬。

二、鐵針樹是平地野生植物，並無經濟價值，但嫩葉可供藥用，種苗無處可買但可試行插條繁殖可能成功。(章樂民)



(Early Russian) 播種後七十天內可收。中生種(臺南白一號)播種後八十天前後可收。晚生種(臺南黑二號)播種後九十天以上才可收。(蘇匡基)

**立農牌**



巴拉松  
馬拉松  
P.B 乳劑  
蔬菜乳劑  
安特靈乳劑  
石灰硫黃合劑

**立農化學工業股份有限公司**

地址：臺北市太原路57號3樓  
電話：41108 41246  
工廠：臺北縣士林鎮蘭雅里32號之3

**經銷處：**

宜蘭：葉宜興行	葉英傑	宜蘭市溜水路92號
臺中：臺中聯絡處	江振通	臺中縣雅羅鄉民生路67號
萬有西藥房	張紹鈺	臺中市前街101號
南投：輝豐行	張錫農	南投縣豐原485
		南投鎮中山街125號
		電話：南投135

員林：美豐農藥行	何阿麻	員林鎮中正路192號
嘉義：年豐農藥行	翁博鈞	電話：員林779
屏東：聯豐行		嘉義縣義竹鄉六桂村199號
		電話：麟水24
		屏東市民路194號



### 防治西瓜蔓枯病

【問】：今年一月初種下的西瓜生長初期即發現蔓枯病請問如何防治？（彰化縣竹塘鄉永安村二號唐德佳）

【答】：一、迅速去除病株

集中燒燬。  
二、每隔十天撒佈三—三式石灰波爾多液一次，連續五、六次，長大後改為撒佈四—四式石灰波爾多液，連續五、六次。  
三、摘心時用藥要消毒。（吳福壽）

### 「施美農」治西瓜蔓割病

【問】：一、西瓜蔓割病如何防治？  
二、何處有售適當的農藥？（嘉義縣太保鄉過溝二十八號）

【答】：一、在根旁灌注「施美農」乳劑或「收敵生」乳劑二千倍稀釋液每坪九公升，灌注二、三次。

二、「施美農」乳劑：臺北市襄陽路廿三號，中國化學製藥股份有限公司。「收敵生」乳劑：臺北市太原路廿號，大勝貿易有限公司有售。（吳福壽）

### 柚類可用嫁接

【問】：文旦斗柚等如何繁殖？栽植後多久可結果？（屏東縣潮州鎮三共里中興路四十七號李添旺）

【答】：一、柚類在過去都採用空中壓條法繁殖，但缺點很多，最近採用苦柚做砧木，和優良品種柚子行嫁接苗發育快入土又深，可以耐旱抗風，對病蟲害的抵抗也更大，值得提倡。（張振宙）

### 經濟栽培白木耳的不多

【問】：一、白木耳在本省是否有人作經濟栽培？  
二、如何栽培白木耳？（花蓮市中華路三三四號蕭春明）

【答】：一、白木耳在本省很少有人作經濟栽培，因為產量不穩定，病蟲害多無適

### 當防治法。

二、白木耳可人工栽培，請看本刊第十卷第廿四期廿二頁。（胡開仁）

### 香瓜要翻果顏色變金黃

【問】：一、香瓜有幾種，何種品種最好？二、用何法可使香瓜成熟時呈黃金色？三、種子向何處購買？（屏東縣萬丹鄉香社村十九號簡安首）

【答】：一、香瓜可分為甜瓜和溫室香瓜兩種，如在露地栽培請種甜瓜，品種以「梨瓜」和「新香瓜（New Melon）」兩種較適合本省風土，鳳山第二市場農友種子行出售的「農友一號」很好。

二、要使成熟瓜顏色平均，要翻整果形使果面普遍照射陽光。

三、三重市重新路三段一〇八號興農種子行有種子出售一臺兩十元。（王進生）

### 洋蔥施肥要早

【問】：一、栽培泉州黃品種的洋蔥在農曆十月移植何時可以採收？二、尿素施用多少？三、要何時停止施肥？四、分球的原因在那裏？（臺中縣東勢鎮下新里粵寧街六十一號張春福）

【答】：一、「泉州黃」在本省無法結球，因為本省的日照時間不足。在臺中東勢地區應在十月下旬以前移植為宜，而且品種限早玉種、勝玉（Grana）或Yellow Dessex（ヤローデセクス）等甜洋蔥。

二、每十公畝施尿素五十至六十公斤。

三、開始結球前一個月停施追肥，十一至一月間儘量促進其生育。

四、分球的原因是苗株過大，在鱗莖內已

經發生兩個以上的生長點成為分球，如追肥時期過遲，亦會引起裂球。（王進生）



## 藥特效熱稻種在來

# 大 好 年

農林廳登記農藥字第二九〇號

### 特 點：

- 一、絕無藥害（據50年度臺中區農業改良場試驗報告）
  - 二、藥效優秀（據50年度臺灣省農業試驗所試驗報告）
  - 三、提高產量（據50年度臺中區農業改良場試驗報告在無發生病害區使用結果增收七%）
- 注 意：避免與安特靈等有機磷素劑混合最好單獨使用

製造元 日本三笠化學工業株式會社

總經銷 裕 隆 商 行

臺中市建國路一六七號

電話：四八五五號

番石榴施肥很有關係

【問】：一、番石榴如何整枝剪定？  
二、番石榴施肥要注意些什麼？（桃園鎮東埔里九鄰四號江榮祿）

【答】：一、番石榴適於環狀整枝，在幼苗生長至二尺左右，將頂端剪去，然後在不同位置留三或四分枝，待分枝生長至一尺左右，再將分枝頂端剪去，並保留兩側發生的分枝，內外兩面的分枝都剪掉，用同樣方法，將側枝修剪三、四次，便可形成所需要的環狀樹形。

二、番石榴是在新梢上着花，如新梢抽生多，開花結果也多，要在二、三月，施下富有氮素的磷磷施下，結果多。（張振由）

山地可以種梅

【問】：一、梅可用嫁接嗎？二、梅和香蕉在山地五百公尺處適當嗎？霧有無影響？三、梅的外銷量大嗎？（花蓮縣鳳林鎮林榮里九十二之一號方魁梧）

【答】：一、現在臺灣栽培的梅有大粒種和小粒種，大粒種需要嫁接。

二、山地五百公尺處可以種梅無霜地區也可種香蕉，霧都沒有大影響。

三、梅近年銷量尚好。（朱長志）

五峰蘿蔔平地不宜採種

【問】：一、五峰蘿蔔種的結果很好，可以自己留種嗎？

【答】：一、五峰蘿蔔種的結果很好，變粗大，確實嗎？（王坤金）

【答】：一、五峰早生蘿蔔在平地採種，因田間四圍有很多其他品種的蘿蔔，會發生雜交，結果變形，品質劣化，不宜採種。

二、切根後移植種子粒的粗細沒有影響。（陳培昌）



石灰改良酸性土

【問】：一、要和山畑的酸性土壤，用什麼石灰最有效又最便宜？

二、矽鎂鈣肥料的含鎂量有多少？價格多少？何處能買到？利現在還可買到嗎？（苗栗縣苑裡鎮為公路三八號鄭桂在）

【答】：一、中和山畑的酸性土壤用生石灰或石灰石粉都有效，買附近工廠的產品最便宜。

二、矽鎂鈣肥料在員林鎮靜修路二三號矽鎂農工廠有限公司有出售每包三十公斤七十二元，但含鎂量只有百分之四，主要成分為矽酸和鈣。（吳石生）

五峰馬鈴薯產量安定

【問】：一、「硫磺氣」是什麼東西？何處有售？有無毒性？二、五峰馬鈴薯種植後約幾天可以收穫，產量如何？（雲林縣元長鄉海仔林安北路二二號陳振元）

【答】：一、硫磺氣是一種化學藥品，是白砂糖樣的結晶無毒性。臺北市的化學藥品店都有出售，一磅裝一瓶約售一百元。

二、春作五峰馬鈴薯約需九十天，秋作九月颱風過後七十五至八十天，冬作（裝作）九十至九十五天，產量較其他品種安定每分地產量約三千五百斤。（陳培昌）

名間鄉有人種矮唐蕉

【問】：一、矮唐蕉「苗何處有售？」（雲林縣土庫鎮順天里五鄰十八號林依仁）

【答】：南投縣名間鄉頂新村陳清江先生栽有一公頃矮唐蕉，可否賣苗請去信問。（翁仁祿）

芳樟可用扦插

【問】：芳樟可用插枝法育苗嗎？（苗栗縣苗栗鎮維祥里十八四號劉家成）

【答】：芳樟可用插條育苗，插穗用一年生的枝條，須留葉二至三片，扦插時期以萌芽前為佳。（康何經由）



藥 農 豐 正

美果素乳劑

防治：柑桔、李、梅、桃、荔枝之捲葉蟲

地特松水溶粉劑

防治：螟蟲、蚜蟲之特效藥

多 穗

是紋枯病之特效藥

螻蛄必死誘殺餌劑

防治：螻蛄，蟋蟀之剋星



商標

註冊

正豐化學股份有限公司

臺中縣 霧峯 電話六三號

綠寶銅可濕粉劑

防治：稻熱病，果樹病害

鐵地旺粉劑

是紅蜘蛛之剋星

益加津乳劑

防治：李、梅、桃、荔枝之捲葉蟲

**土壤改良劑 禁止進口**

【問】：一、滲透劇烈的「漏水田」，可用「ベントナイ」改良嗎？  
二、本省現無這

種材料，宜改用甚麼代替？（雲林縣虎尾鎮北溪厝十六號鄭承宏）

【答】：「ベントナイ」是土壤改良劑但現在有關土壤改良劑都禁止進口，因為對它的成分還沒有明瞭。

二、如有進口部作為「ポリチン」的原料，課稅較重，農友無法負擔。（王進生）

**打針的鷄多吃有害**

【問】：公鷄打針後，能不發情，加快肥大，人吃了這種雞肉有毒嗎？（雲林縣二崙鄉楊賢村竹園路二九號坤振）

【答】：一、公鷄打針藥「肥育丸」是一種內分泌的藥劑，公鷄被注射這種藥劑後，會變成女性化，比較安靜而容易長肥，但注射一次只能維持八、九星期，藥性過後就沒有作用了。二、藥性沒有過時的鷄，人吃了雖然沒有毒，但是如與經常吃，鷄肉中剩餘的內分泌藥劑，對人也會發生不良的影響。（李登元）



**地山春植馬鈴薯**

春植馬鈴薯，通常在二月下種。據新竹改良場說，五峰種馬鈴薯如在山地春季栽培，三、四月還可以下種，且因不必催芽，省錢又省工。希望栽培的農友們，請向「新竹市海雅街新竹區農業改良場陳培昌先生」洽詢。

**不必催芽 省錢省工**

**樹薯粉水有毒不能利用**


【問】：一、樹薯經去皮、磨碎、過濾、待粉質沉澱後，上面殘餘的粉水有何成份？  
二、這種粉水靜放幾天後會發泡是否有毒素？  
三、這種粉水能作養豬飼料嗎？（南投縣南化鄉社寮村八十六號羅國年）

【答】：一、樹薯經去皮磨碎過濾，待其粉質沉澱後上面的水並沒有什麼營養甚至多含少量可溶性的澱粉而已。

二、那種粉水放久會發泡，因為水裏含有磷酸毒素。

三、那種粉水不宜作家畜飼料的飼料，因為不但無益，而且具有使中毒的可能。（李登元）


**農作物增收劑 木オゲン**



綜合微量要素 廣面與市用  
**木オゲン**  
クラウン化成株式会社

◎效果◎  
①水稲：秧苗健育，預防倒伏。②預防樹木：粒質良好，果實甘甜。③防止果實落粒。④促進早期收穫。⑤提高產量。⑥增加葉綠素，強壯收量。

豐裕農藥行  
總代理 民生路230號  
電話 583號

請認明 拜耳商標是  品質高超 信用可靠之標記


**力拔山乳劑** **地特松粉水劑**

低毒性殺蟲劑!!

現貨供應：正豐化學股份有限公司  
臺中縣 霧峰 電話63號

臺灣總代理：中德貿易有限公司  
臺北市博愛路98號  
電話：33157、33158、33159

悠久 歷史 卓著 信用

 豬驅蟲藥 阿斯卡利肯粉 (新包裝)

豬、鷄驅蟲聖藥

**新阿司卡利肯粉·丸·錠**

「優點」①比匹拉淨製劑。②一次投藥即可驅蟲率一〇〇%成蟲蟲卵都全滅。③絕無副作用，給與方便，混合水飼，濕飼、乾飼、都可以。④價格最便宜。

**鷄、鴨禽類治療預防聖藥**

**回生丹丸錠**

「優點」①効力最快抗生物質製劑。②治愈率最高，一日一回投藥即可，効力持續時間最長。③價格最便宜。

臺灣獸醫儀器藥品股份有限公司  
臺北市信義路二段一二〇號  
電話：二四〇六五、四七六三五  
郵購請利用彈局別撥點金帳號一三八〇八號

全省飼料店農會藥房均有售