

公猪交配次數太多而性慾減退的，應停止交配讓它恢復體力後再供配種。
懷疑精蟲有異常的應請獸醫檢查精液，在顯微鏡下可以找出原因來。
母猪患有子宮炎、膈炎，應即請獸醫治療。如發情正常而原因又不在公猪，外觀沒有特異的症狀而不孕的，據本文作者試驗結果，使用腦下垂體前葉荷爾蒙在發情前二、三天，使用五百至一千單位，或用黃體素在配種後第二天起每天使用十公厘連續二、三天注射在臀肌部份，有百分之五十的效果，如果在發情前使用前者，配種後使用後者，效果可達百分之七十五至八十五。
如果這樣治療還沒有效果，應該早期淘汰，免受損失。

牛 羊急性鼓脹病

——李培元——

牛羊的急性鼓脹病，症狀很明顯，治療也容易，問題是要發現得早。

早春季節，牛羊容易發生急性鼓脹病，原因很多。

飼料和運動關係很大

容易發酵的飼料，或者精飼料吃得太多，也有的是因為所吃飼料中的纖維素太少，以致第一胃和第二胃突然產生多量的氣體而患急性鼓脹病。

牛羊吃了可使第一胃和第二胃肌肉麻痺的有毒植物，會使胃不能運動而患急性鼓脹病。牛羊的急性鼓脹病，有時發生在被長途汽車輸送之後，使第一胃的運動受到障礙，相反的，平時運動不足或在疾病恢復期身體還很衰弱時也會引起急性鼓脹病。

如果牛羊在採食後就服很重的的工作，或是劇烈運動，或是放牧後立刻攝取飲水，也會引起這種病。

幼小的牛羊吸乳太多，或者原來吃慣了乾草，突然改為吃青草等都可以誘發這種急性的鼓脹病。

腹大和噯氣便是鼓脹

患了急性鼓脹病的牛羊，腹部會很快的膨大，左側特別顯明，同時第一胃運動完全停止。食慾和反芻也消失了，這時噯氣，偶然會嘔吐，開始發病時還能排糞，到後期就沒有了。呼吸很急促，前肢張開，不想運動。因為第一胃的壓迫血行受到障礙，可見粘腹藍紫，耳根肢端發冷。各種病狀要看胃裏氣體的多寡而有輕重，輕的半天到一天會痊癒，重的幾小時裏就死亡。

按摩和藥物同時並用


如果一旦發現牛羊有這種徵狀，必須緊急救治，高舉牛羊的前身，按摩兩側胸部，牽引病畜上坡路，胸部灌注冷水。或者把舌頭引出口外，使舌頭能上下運動。有的時候可以塗煤溜油在嘴裏，另用小竹枝纏了麻布刺激軟腭或咽門等，促使嘔吐和噯氣。

也有的灌食百分之三十的稀鹽酸十至二十西西，或用福馬林十至三十西西，百分之二、三的鹽水幾公升，或是石灰水一至二公升，或克遠林三十西西加入水中灌食，用以制止胃裏的酸酵繼續產生氣體，並可驅出胃裏的氣體。

此外，須注意病後的飼養，以防再發。同時如果自己沒有治療的經驗，最好是請教附近的獸醫。



，酒外愛品高國外
，貨國用國愛國同
，(多)坐正良良精貨國
。(品來帕)賣來宅洋外(基不)輸快



，尋相衆友朋(戚)成親
，鞋脫也衫脫通無
，改袂那背露胸酥
，題問無笑偷人乎



，(面裡)底內穿衫內衣
，(思意好不)勢夕與客會穿衫是那
，(情交)培交好禮到方大