



雄縣美濃鎮廣林里廿三號
吳同拾

【答】：一、懷特樣
果英名 White 或 Ivory
，是樣果中的著名品種。
果長形，本省俗稱為芭蕉

橡果懷特品種很好

【問】：一、橡果懷特種的肉質如何？
二、文旦柚南部山地是否可種？
三、橡果愛文品種南部何處有售？（高

【答】：一、香蕉主要蟲害有三種：(1)象鼻蟲，應於十二月至翌年三月間噴射百分之十八、八地特靈乳劑三百倍液或百分之五十地特靈可濕性粉劑七百倍液，一年噴射二、三次即可。(2)野蟲應噴佈百分之五十馬拉松五百至八百倍液。(3)粉介殼蟲噴佈大利農六百至一千二百倍液。

二、香蕉施肥與磷鉀三要素比率為一比一。三、折合肥料量每年每株應施硫酸銨一、三毫斤，過磷酸鈣一、四毫斤。氯化鉀一、三毫斤另施堆肥十七至廿五毫斤。施肥時期南部以七月至九月為主，每隔一月一次，分五次施用。中部以二月至三月為主，每隔二月一次分五次施用。至於灌水是以乾燥季節為主，同時依據土壤性質而異，中部十至三月為主，每月灌水一至二次，南部十至六月為主，每月灌二至三次。（王兆全）

培養洋菌參考臺灣季刊

【問】：有無培養銀耳菌的專書請示知。
（臺中縣太平路五十七號王坤南）

【答】：市上現無白木耳菌種培養法的專書，請參考臺灣銀行季刊第十四卷第一期「臺灣之洋菇菌種培養法」。（胡開仁）


香蕉害主要有三種

【問】：一、香蕉樹的蟲害有幾種？應用何藥防治？
二、蕉樹的施肥及灌漑應如何較為適當？（彰化縣二林鎮南光里成美巷三五號蔡慶宏）

模仔。成熟時由黃綠色變為黃色。風味特殊，未經後熟而果肉尚未變柔軟時，即可切食，味似桃肉，經適當後熟的，風味甜美可口。過熟則食味變劣。

二、文旦柚對南部氣候應可適應，因果實是在八月間成熟，對秋後的乾燥，並不會受何影響。但入春開花期間，土質過於乾燥的，將引起落花落果現象，值得注意。

三、愛文種橡果幼苗，請向鳳山熱帶園藝試驗分所洽詢。（張振甫）



果園防風樹相忌樹

【問】：本人急於要造防風林，請問若同時播種銀合歡和觀音竹苗，那一種比較快而有防風作用？（盧增壽）

【答】：一、銀合歡和觀音竹在北部生長都很慢，為永久防風計果園周圍宜種相思樹和觀音竹。

二、在永久防風林未形成時，可用印度田菁先作臨時防風林。

三、印度田菁生長快，但因樹冠不高且不密生，故應密植且果樹相隔三、四排即應密植一排印度田菁。

四、印度田菁為豆科植物可作綠肥，但易被棉介殼蟲為害應注意防治。（嚴夢如）

橄欖栽培容易銷路不好

【問】：本人想種植橄欖，何處可買到苗木？（臺北縣板橋鎮文化路四巷七號陳孝先）

【答】：橄欖栽培容易，產量很高。近年來因受銷路影響，價格過於低廉，原來南投一帶所栽培的橄欖樹大多已伐除，改植鳳梨和荔枝等。苗圃商已不再注意培育是項苗木，如一定需要幼苗時，必須委託適當苗圃商辦理。（張振甫）

農藥成份標準 保證品質優良

- | | | |
|--------------|-----------------|----------|
| 臺北 新莊榮隆行 | 臺北市湖北街二段 219號 | 電話 46733 |
| 桃園 豐年農產行 | 桃園縣中壢鎮民權路35號 | 電話 321 |
| 新竹 新竹清果運銷合作社 | 新竹市西大路 105號 | 電話 1425 |
| 苗栗 忠農行 | 苗栗縣竹南鎮八德街45號 | |
| 南投 泰生保苗堂 | 南投縣南投鎮民族路113號 | 電話 222轉 |
| 臺中 進豐行 | 臺中市向上路一段2號之5 | 電話 6227 |
| 生光農藥行 | 臺中市興中街13號 | 電話 4384 |
| 彰化 英豐行 | 臺中縣霧峰鄉中正路327號 | 電話 63轉 |
| 德榮行 | 彰化市民生路166號 | 電話 401 |
| 雲林 惠豐行 | 雲林縣虎尾鎮光復路48號之1 | 電話 363 |
| 嘉義 年豐農藥行 | 嘉義縣義竹鄉六佳村三鄰199號 | 電話 24 |
| 臺南 謙泰農業資材行 | 臺南市公園路173號 | 電話 3497轉 |
| 高雄澎湖 富農農產行 | 高雄市中正路180號 | 電話 21069 |
| 花蓮臺東 邱協成農藥行 | 花蓮市中正路8號 | 電話 990轉 |



巴拉松乳劑
P M 乳劑
馬拉松乳劑
安特靈乳劑
地特靈乳劑
D D T 乳劑
魚藤精乳劑
利我農乳劑

中農化工廠股份有限公司出品



現貨供應

總公司：台北市南陽街廿一號 電話：三一六六〇
工廠：台北縣景美鎮中正路三一七號