



菜豆不宜連作

【問】：一、矮性菜豆皇帝豆種子何處有出售？

二、它的產量如何？所需肥料三要素各如何？適於何種土壤，PH值如何，爲何有忌地性（忌連作）？

三、病蟲害有幾種？防治法各如何？對於栽培上的技術有那些必須注意？（彰化市與北里民生路一四五號吳昭南）

【答】：一、矮性菜豆的優良品種有 Look 二四二（フールドフック二四二）鳳山第二市場農友種子行有出售。

二、每十公畝連作的產量一千二百至一千八百公斤，肥料三要素配合爲氮素八公斤，磷九公斤，鉀七公斤。適於沙質壤土，土壤反應 PH 五·八—六·五因爲易有菌核病發生，故不宜連作。

三、病蟲害甚少，炭疽病用賜保根勵行種子消毒蚜蟲宜噴射馬拉松八百倍液，如有菌核病發生用水銀劑消毒。（王進生）

每甲需薑種三千公斤

【問】：一、新墾山地栽培生薑須施何種肥料？

二、一甲地要若干種薑？

三、薑粉工廠和銷售香港的市價各如何？（花蓮縣鳳林鎮大榮里九十號李見長）

【答】：一、種薑每十公畝施肥料三要素用量爲氮素廿三—廿六公斤，磷酸十六公斤，鉀廿一—廿四公斤，化肥以尿素、過磷酸鈣和氯化鉀爲主。

二、每公畝須種薑普通以二千八百—三千公斤爲準。

三、薑粉工廠的原料收價和香港市價等宜直接向豐原鎮中山路二八二之一林興農行詢問爲宜。（王進生）

飼料不能加防腐劑

【問】：一、鄭謀平先生所設計的銀合

歡展壓器，何處可買到？

二、澱粉、魚骨粉造成後，加什麼防腐劑，而家畜不受害？（新城醫院陸生）

【答】：一、鄭先生所設計的銀合歡展壓器，似無廠商承製，鄭先生現在臺中與大學農學院畜牧系教書，可請直接函詢。

小豬得病快請獸醫

【問】：我所養的小豬爲何會一致的發抖並且食慾減少，身體發熱，不能爬起，必須人工餵牠如何補救？（花蓮市大馬街十六號黃裕泰）

【答】：小豬食慾減少，體溫高，是豬隻一般得病的症狀，和食料氣候等無關，應請附近農會獸醫詳細診斷對症下藥治療爲要。不能亂投藥物。（李登元）

肉用雞育雛箱的大小

【問】：肉用種雞雛十隻容納到八週的育雛箱，要多大？（雲林縣林內鄉九崙村長流仔十一號曾文信）

【答】：容納肉用雞雛十隻到八週的育雛箱高一尺寬二尺長四尺的長方形即可，四週無木板，箱底及箱蓋可應用龜目鐵絲網釘成。（李登元）

鷄患咯布治療要早

【問】：雞雛約兩個月，眼中有白色污物，有時成塊狀流淚，暫時或永久失明，萎縮，減重，終至死亡，如何治療？蘭嶼椰油蘭嶼開發公司徐培遠）

【答】：據上述情形，雞雛是患「咯布」病，在早期可用抗生素如金黴素或鏈黴素等治療有效，等到眼中有白色物成塊即不易治療了，這種病的預防在管理上應注意雞舍通風良好，保持乾燥暖和，管理得法就不容易患此病了。（李登元）



政府登記 合格農藥



豐年牌農藥
興農化工股份有限公司

台中縣大里鄉內新路五九號

電話：二六九·四六八八

魚臭米賜多乳劑
富粒松乳劑
依必安乳劑
賽文可濕性粉劑

15%3%BHC粉劑
65%BHC可濕性粉劑
賽文粉劑
稻熱病藥劑
（西樂生石灰）

臺北連絡處：臺北市紹興北街31巷26號（臺北縣農會對面）

電話：三八八二六