


草並施肥。到了第三個月，因為分蘗已多，雜草不易再成長，可不必再除草。定植初期宜勤灌水，以免影響成活和初期的發育。此外並應注意噴藥除蟲等工作。

小心施肥。促進生長

基肥在整地時施入畦中。每分地施堆肥約二千壘斤（或人糞尿二十擔），草木灰三百壘斤。使用人糞尿時，宜提前在定植前十五至二十天施用，以免發生地溫過高現象。追肥可用稀薄人糞尿或硫酸銨。每分地每次約用硫酸銨二十公升或尿素十公升，在除草淺耕時均勻撒佈畦上。栽培末期不必施肥。

防治病蟲。注意用藥

杭菊的蟲害，以蚜蟲較為常見，可噴魚藤精乳劑五百倍液或馬拉松一千倍液防治。有害農藥在結蕾後應一律停止施用，以免除毒殘留，影響品質。發生立枯病、散紋病時，可噴波爾多液或四百倍大生液。同時應拔除病株，消毒跡地。



形情花開菊杭

臺灣黃麻怎樣減低生產成本 提高單位面積產量？

季景元

（上接第二十一頁）

推行機械採剝

（3）徹底防治病蟲害：黃麻病害應着重預防。選種抗病品種，發現害蟲時，立即選用經濟有效的藥劑撲殺，注意栽培管理，消毒種子，實施輪作，適當調節灌溉排水，增施有機肥料和鉀肥，施用氮肥不過量，注意肥料適當配合，清除麻園病株雜草等，都可以減少病蟲發生。

用棉麻所C型動力採纖機剝製黃麻鮮皮，每天十小時可剝取黃麻二十五至三十公畝，較手工剝皮可節省工費百分之十一。三倍，每公畝可節省工費用六百元左右，剝皮成本僅有手工剝皮的七分之一左右，且所剝製的鮮皮三，天，並可增加精洗率七多，即將推廣，值得採用。

強力殺蟲劑

スミチオン

速滅松

人畜無害 毒性低微

特點：

1. 對人畜的毒性低微，祇有巴拉松之 100 分之 1，因此可安心使用。
2. 殺蟲力、滲透力強烈，對螟蟲及其他主要害蟲之殺效優於巴拉松，且其殘留性優越。
3. 適用範圍甚廣，對水稻、大豆、果樹、蔬菜、茶等之害蟲殺滅有優越效果。
4. 對農作物不發生藥害。



日本原裝
品質保證



現貨
供應

農藥字第139號

製造元



住友化學工業株式会社

總經理處

瑞豐股份有限公司

臺北市長安西路172巷1號 電話：46640