

減低生產成本
提高單位面積產量？

選擇適當土地

最好選用前作曾積水種水稻，沒有線蟲病發生的土地。如果沒有這樣的水田而要測定上中線蟲，可於秋季八至十月，在甘藷、花生等行上株間，以行距五至十公尺株距二至四公尺，種植番茄苗或米豆，做為指示作物。經一至一個半月後，拔起根部調查，如在主根上發現較多線蟲根瘤時，則不宜栽培黃麻。

選用優良品種

臺南棉麻試驗分所近年育成「臺農一號」新品種，較原栽培品種「水土青皮」增產十至十五%，



元景季

已繁殖推廣。各位麻農可選擇農林廳種子檢查室檢查合格的種子栽培。

調節種子供應

- (1) 遲播採種：黃麻延遲到六月播種，纖維產量雖略減少，但可減少風害，增加採種量。
- (2) 扦插採種：黃麻採種期或生產後期風災後，選取良種梢頭部，用改良繫插法扦插，可提高成活率，保持品種純良，確保採種量。
- (3) 風災後加施肥料：黃麻生產後期，受暴風摧殘後，酌情增施半量化學肥料，可來殘留果枝結實，增加採種量。

建立繁殖制度

藏庫，預存種子，或將剩餘種子集中貯藏，逐年更新，確保發芽率，準備供種子缺乏時的急需。有效調節種子供需，可維持種子合理價格。

由農林廳規劃主持，建立完善的三級制度良種繁殖制度，嚴格執行種子檢查。由臺南棉試驗分所負責原原種繁殖，種苗繁殖場或當地農業改良場負責原種繁殖，縣政府或農會負責採種田經營；在技術上有特殊問題時，由臺南棉麻試驗分所協助解決。這樣分工合作，才能確保純良品種順利推廣。

建立耕作制度

- (1) 配合前後作，推行合理輪作：黃麻宜與水稻輪作，如在兩期作水稻區，黃麻必須在八月初第二期水稻插秧前收穫；如在單期作水稻區，則在水稻收穫後可栽培一季旱作，再行種植黃麻。宜視經濟利益調整配合。

(2)兩期作水田區可推行黃麻中間作栽培，以經濟利用土地，提高單位面積純收益。中部地區，應

作物名	適	用	病	害	名	散	在液	稀釋	倍數
稻	稻熱病	菌核病	白葉枯病	五、〇	一	二〇〇	一	稀釋	倍數
胡	瓜蔓枯病	露菌病	炭疽病	六、五	〇〇	一	二五〇〇	倍	
柑	枯黑點病	瘡癰病	潰瘍病	一、五	〇〇	〇	一	〇〇〇	倍
棉	花角斑病	炭疽病	立枯病	一、五	〇〇	〇	一	〇〇〇	倍
菸	草履病	赤星病	立枯病	一、五	〇〇	〇	一	〇〇〇	倍
麻	腰折病	角斑病	炭疽病	一、五	〇〇	〇	一	〇〇〇	倍
甘	諸縹芽病	斑點病	黑斑病	一、五	〇〇	〇	一	〇〇〇	倍
薄	荷銹病	白星病	菌核病	六、五	〇〇	〇	一	〇〇〇	倍
落	花生褐斑病	黑斑病	炭疽病	一、五	〇〇	〇	一	〇〇〇	倍
豆	類露菌病	銹病	炭疽病	一、五	〇〇	〇	一	〇〇〇	倍
薯	茄疫病	葉癰病	輪紋病	一、五	〇〇	〇	一	〇〇〇	倍
蔬	菜黑斑病	腐敗病	菌核病	一、五	〇〇	〇	一	〇〇〇	倍
香	蕉黑星病	葉斑病	炭疽病	一、五	〇〇	〇	一	〇〇〇	倍
花	卉炭染性諸病害								



農林廳登記
第70號

サンミクン口乳劑
(純美谷農乳劑)

稻熱病特效藥

屏東連絡處：
屏東市民生路226號

惠光貿易有限公司
臺南市東門路140號 電話4971號