

的纖維往往過多，尤其是在砂土生長的嫩莖，基端外皮粗厚，在加工時必須剝皮，致使「步留」減低。

為儘量減少上述不良現象，必須注意氮肥的用量。一般說來，氮肥缺少時品質較差。但是施用量一時過多，則易發生「贅枝」，減低產量。所以除秋冬夏季三季主要施肥外，應依嫩莖發生情形，隨時加施少量尿素為宜。每十公畝每次用量，以不超過六公斤為佳。

施用尿素時，宜加用氯化鉀二公斤左右，始能產生肥大的嫩莖。

水分缺乏時，嫩莖不但容易硬化，而且容易變為紫色，所以長期乾旱時，應充分灌水。

灌水宜採用溝灌的方式，但在砂質大面積不易做到，所以以小面積輪流灌溉為佳。如果可利用地下水，應儘量利用。

病蟲害可使品質變劣，應特別注意。尤其在臺灣利用若干母莖葉在生長期製造養分，應保護母莖葉的健全。

最近在各地發生生理病，莖葉頂端逐漸萎黃，無法生產品質幼嫩的嫩莖。發現此病的地區，應勵行灌溉，並施用多量腐熟堆肥，提高土壤團粒組織，但是不要使堆肥和根莖直接接觸。

利用豆科作物作為有機質來源，也可以改良土質，所以在一、二年生時，應間作豆科作物。

至於蘆筍栽培技術的細節，請參看臺灣農業服務社所編印的「臺灣蔬菜栽培法」。

果葉兼用桑樹種

尚不宜大量栽培

桑樹所結的桑椹，含有多種維生素和其他有益人體的成分，可製果汁、果醬、果膏、酒、罐頭、脫水桑椹等，但在「產」「製」「銷」問題獲得配合以前，不宜盲目種植，政府也還沒考慮推廣。又有些人乘機虛偽宣傳，請農友注意品種等問題，最好請專家鑑定後購買。（蠶改場）

謹請各界觀摩

獨家新種春播成果展示會!!

1 品種：新奇 F45 日成功結球白菜
文配 F45 日成功結球白菜

2 定植 3 月 18 日 收穫 5 月上旬

3 成果：栽培六分地二萬一千株，結球百%，每粒二至七臺斤，球型豐圓雪白美觀。

4 觀摩日期：五月三、四日兩天下午一點至五點止。

5 地址：公路局彰化 II 花壇間之「北口庄」站下車入東三分鐘就到，北白山坑蔣水池先生之菜園。

主權開會人 農生種子行

蔡文卿 敬請

彰化市南門市場內

謹告各位農友顧客們!!

敝行爲業務擴展之需要，自四月二十三日遷移到新店址照常營業，電話亦同時改為二二四四九號，懇請各位顧客們倍舊愛顧光臨指教是禱。

富農種苗行謹啓

新店址 高雄市林森一路一五〇號

電話二二四四九 郵劃高字四〇七一四號

富農種苗行專營各國優良蔬菜、花卉、果樹種苗、農藥，農具應有盡有。

「富農園藝吉報附郵二元 價目表函索即寄」

品質優良定價低廉 如蒙賜顧無任歡迎

本公司 BHC 粉劑供應站及連絡處：

- 一、高雄土地銀行內 電話 333 號
- 二、臺南縣農會 電話 333 號
- 三、嘉義土地銀行內 電話 333 號
- 四、雲林縣西螺鎮中興里 電話 333 號
- 五、彰化中正路 333 號源裕行 電話 333 號
- 六、竹南八德街 333 號 劉金治
- 七、新竹東門市場內 三信行 電話 333 號
- 八、桃園中正路 1103 號 農友行 電話 333 號
- 九、花蓮豐田本公司礦場 電話 333 號
- 十、宜蘭縣農會 電話 333 號
- 十一、臺北市通化街一段 51 號 許先印 電話 333 號

靈丹粉 BHC

水懸粉 劑

青蛙牌



B. H. C. DUST
中國石礦股份有限公司