

一元登李

點要的鷄閹

的幸部為害的，不論發現成蟲或幼蟲，都應該期作時造成大害。可以用一·五% BHC 粉劑馬上防治，使它們不致大量繁殖，以免到第二，每公頃四十至五十公斤。

*

*

*

*

有些農友，住在偏僻的鄉村裏，距離城市很遠，養了些鷄，要找閹鷄的人很不方便，或則養了大批的，如果要請人來閹，費用也很多，不如自己學會了閹鷄的方法，既方便，又省錢。

要閹的鷄，最好在閹割以前十四至十八小時不要餵飼料和飲水。在閹的時候把鷄的翅膀和腳輕輕的踏著，然後：

(一) 先拔掉臂前的羽毛，如果仍舊留有少許羽毛時，可以用清水使毛濕潤。

(二) 用左手中指壓臀部，並把皮膚向後拉緊。

(三) 同時用左手食指，在最後兩根肋骨的下面，同樣把皮膚拉緊。

(四) 在最後兩根肋骨中間，離開背骨下面約二分之一至四分之三吋，用銳利的小刀把皮肉切開。

(五) 刀口切到四分之一至二分之一吋時，先用擴張器插入開口的地方，慢慢的張開，再繼續切下去，切到約一吋為止。

(六) 用鉤撕開小腸上的薄膜，這時就可看到一顆像小麥或大豆大小的長形淡色的睪丸附着在上面，睪丸是靠近背下動脈，只開一邊的，須先把比較難取出的下面一粒睪丸先拿出來。

(七) 用專門除去睪丸的鉗子慢慢的從上面的睪丸下伸入，並且小心的向上輕壓，然後用鉗子的圈面，翻出下面的睪丸，使容易看到。

(八) 稍為張開去睪鉗，使睪丸安放在鉗子平底的一面。然後鉗緊而小心一拉。


(九) 去睪鉗從側邊輕輕拉出二、三次，使血管容易見到。而後再緊壓，並把鉗子扭轉拉斷睪丸的繫帶而拿出來。

(十) 拿掉了下面的睪丸後，再拿出上面的一粒。

(十一) 當割取下面的睪丸，如果有困難時，亦可在另一邊用同樣的方法切開取出。但是一般都是祇切開一邊，比較省時，而且可以減少傷口暴露的危險。

(十二) 最後要把肌肉和皮膚合齊，使鷄恢復原狀。

在本省東部地區如果要買閹鷄的工具，可就近向花蓮市新港街二十五號花蓮種鷄場洽購。



，殖繁可工人魚鯉
，息消好項一症這今
，魚飼來友，裏後利
！實穩更定一測



，携着有家專產水
，蒙爾荷射注魚鯉！
，胎受魚助幫工人
！功成已年二驗試