

# 甘藷苗?

# 怎樣

## 培育

·寬金簡·

甘藷是靠甘藷苗繁殖的作物，有了優良的甘藷苗，才可以期待好的收成，所以，優良甘藷苗的培育，是甘藷栽培上的第一要務。

五、六月是甘藷育苗的適期，要想提高甘藷的產量，應在這時培育優良的甘藷苗。

### 更新甘藷苗 提高產量

本省一般農友栽培甘藷，習慣上都採用育苗。年年採用本圃苗而不予更新，苗的生理機能因而逐漸衰弱，雖然生諸的個數並不見減少，但是大諸變小諸，產量逐年地減少。

### 二種不同的 育苗方法

培育甘藷苗，可以採用下列二種方法：

**植藷育苗法：**下種種藷，由種藷直接育成諸苗，供給本圃種植之用。此法種藷用量多，但省工、省地。

**植苗法育苗：**先由種藷育成諸苗，再經移植繁殖

植後採苗，供給本圃種植之用的。此法種藷用量少，但費工多，所需土地也大。

### 到處可以設置苗床

本省是高溫地區，只要選擇土質疏鬆排水良好的土地，在露天任何地方都可設置苗床。

設置苗床的地方，最好先施用四十%「阿特靈」可濕性粉劑，防治土壤害蟲後開始作畦。畦寬三尺，畦高五至六寸，畦間設一尺寬的溝，做為排水通路之用。

### 選用優良標準種藷

種藷的品種來源必須純正，塊根大小宜適中，每塊重量約為半斤左右，諸形整齊，塊根外皮須完整而無傷痕，且無病蟲侵蝕的，種藷價格每公斤約為一元。

至於品種，應選用各試驗場所所育成最適該地區的優良品種，如「臺農五七號」、「臺農三一號」、「臺農五三號」、「新竹一號」、「沖繩一〇〇號」等種藷。

### 五六月間下種育苗

種藷下種前，先在種藷頭部直徑約半寸的地方切斷，斷面塗抹草木灰，以防病菌侵入，引起腐爛。

自己培育甘藷苗，所需要的種藷數量和苗床面積，因育苗方式不同而不同。現在以每公頃本圃種植藷苗三萬株計算，分植藷育苗法和植苗法育苗說明如下：

### 每公頃需三萬株苗

種藷頭部切斷與否，對發芽數沒有影響，但是切後發芽所需日數可以縮短，且可使藷苗生長整齊，不過在黑斑病為害猖獗的地區，以不切為宜。

種藷處理後將頭部向上直立或稍傾斜埋入土中。植藷育苗法畦間種植距離橫直各為一臺尺半，在畦的兩側種植。植苗法育苗也在兩側種植，但藷苗種植橫間距離為一尺半，株間為九寸。

種藷頭部須蓋土，不可露出地面；如遇雨水沖刷頭部露出時，須注意覆蓋。

甘藷塊根在下種時不用橫埋，並不是和發芽數的多少有關，主要為橫埋時下面的芽要彎曲後始能發育，使藷苗生長不整齊，同時因甘藷塊根不定芽的發生，以發育機能較旺盛的頭部為多，所以，下種時應特別注意辨別種藷的頭尾。

種藷的種植時期，依本圃種植期不同而有差異。例如甘藷種植期在八至九月間，如果用植藷育苗法，種藷下種期約在六月左右，植苗法育苗則在四至五月下旬。移植期約在六至七月上旬。一般下種時期約在四至六月間。

聞名世界  
美國  
杜邦農藥



水稻 螟蟲 特效藥  
柑桔 紅蜘蛛

## 依必安乳劑

強力殺菌劑  
稻熱病特效藥

## 強力 谷樂生 殺菌劑

最低毒性  
蔬菜、家畜、倉庫、家庭用殺菌劑

## 馬力特 殺菌劑

蔬菜各種病害特效藥

## 萬生 殺菌劑

鳳梨、甘蔗、果樹園  
長效性除草劑

## 卡滅克斯 除草劑

臺灣總代理

合裕貿易股份有限公司

臺北市中正路1199號

電話：48913