

日產農藥

PIN必愛用

防治水稻二、三化螟蟲強力殺蟲劑

臺灣省植物保護會推廣

300cc × 30瓶

進口原裝供應

臺灣總代理

日星實業股份有限公司

臺北市南京西路五號之一
電話：四〇五五〇・四〇六六〇・四七三七四

日產農藥

植諸育苗法：每甲地需種諸七百五十臺斤，相當於每個半臺斤的塊根一千五百個。每甲地需要苗床五厘地。每個種諸採苗二十株，育成總苗數三萬株。

植育苗法：每甲地需種諸二百五十臺斤，相當於每個半斤重的塊根約五百個。每甲地需面積一分一厘地。每個種諸採苗十株，移植苗數五千株，每株諸苗繁殖數約六株，育成總苗數三萬株。

苗期注意摘心管理

苗床期的主要作業，是摘心、整枝、中耕、除草、施追肥和灌溉等，可視實際需要而舉行。

摘心整枝也因育苗方式不同而不同：

種諸育苗法：種諸發芽後，選留發育強健苗七至八枝，其餘的全部摘除，然後把留存的各枝諸苗在距地面第三節處摘心，如諸苗發育不良，待較芽發生後，就在根際每分地施用硫酸銨十五臺斤，並在根際培土，以促進生長。

植育苗法：植育苗法在種諸圃內不必行摘心，

待諸苗伸長至一臺尺左右時，選發育強健的各剪十株移植。

當苗成活伸長後，距地面四至五節之間摘心，使各節腋芽伸長。如果圃場肥沃，且距移植期還有一個月以上之時間，為防止腋芽伸長過長觸地生根，每分枝可留二節，摘心採用第二次分枝。

紅棕應選庇蔭處栽培

紅棕的主產地是嘉義縣奮起湖，種苗或種子可逕向該地購買。種子在十一月間採收後即可播種。整地後可不必做畦，每隔約十五公分開溝一條，每隔八公分播種子二至三粒，覆土厚約一・五公分。發芽後宜搭蔭棚。

幼苗於第二年春天即可移植，移植的株行距約為二十公分，出山的苗，棕頭最好有姆指大為最宜。在埔里鎮可以栽植棕樹造林地以庇蔭處為宜。肥料影響棕毛收穫量頗大，栽植時宜在植穴內施放堆肥與木灰。以後的施肥工作，也不可以忽視。應在除草後施用。（施文君）

清除香蕉萎縮病株

盼農友們繼續合作

政府為提高香蕉生產，增加蕉農收益，從今年一月至四月間，在臺中區發動了一項清除香蕉萎縮病的運動。這項工作，出動指導員六十二名，督導員十二名，配合由蕉農組成的生產隊，連續努力工作三十七天，總共掘除一百一十七萬多病株，並由政府供應健壯的，在萎縮病發生嚴重的玉山線舉行補植。

這次大規模推行清除病株，蕉農都很熱心，所以，工作非常順利。不過這個病害，單靠一次清除是不夠的；今後三數年內，每位蕉農都要提高警覺，發現病株時，先以煤油噴殺媒介寄蟲「蚜蟲」，然後掘起全株（連同地下部吸芽），再選擇健苗補植。大家愈認真執行，那麼本病的撲滅，便愈迅速。