每公頃施用堆肥六千公斤和過磷酸鈣一百一十五公斤爲基肥，並以硫酸銨一百公斤爲追肥。

黃麻　種較好。如無上述品種種子時，採用其他品種亦可。

黃麻播種適期，中部爲四月五日至二十日之間，因此，愈早愈好。

先行犁田，在播種前二至三天再精細耕碎耙平土塊三寸鋤頭開淺溝，作爲播種溝，條播，行距五十至六十公分，最後每十公分留一株。如果播種期過遲，可以採用移栽方法，即利用間拔苗照上述距離來移植栽培。

每公頃施肥量如下：堆肥三萬公斤（基肥），硫酸銨七百公斤（基肥三百公斤，第一次及第二次追肥各二百公斤）。過磷酸鈣二百四十公斤（基肥及第一次追肥各一百二十公斤）。氯化鉀一百五十公斤（基肥及第一次追肥各七十五公斤）。

堆肥半量在整地時撒佈於田面，半量在播種後覆蓋種子上面。第一次追肥於種子發芽後經過三星期時，第二次追肥於第一次追肥後再經三星期左右時分別舉行。

注意防範稻熱病！

稻熱病是本省稻作最嚴重的病害，尤其在第一期作時，往往會大發生，引起嚴重的損失。這幾年來，由於氣象條件等因素不適於稻熱病發生，饒倖未曾遭受災害，農友們可能漸漸忘記該病的嚴重性，不注意防治，但據目前的初步觀察，本期作該病可能會比往年來得兇。

政府爲檢定由各試驗場所育成的水稻新品種對稻熱病的抵抗性，幾年來都在宜蘭縣壯圍、臺中縣東勢、屏東縣萬巒、臺東縣關山等地設置病圃，以多施氮肥誘發稻熱病。前幾年，因爲稻熱病發生輕微，曾使這種試驗未能獲得明顯的差異。但是本期作各地試驗病圃多已發生相當嚴重的稻熱病，尤其是屏東萬巒的試驗田，栽培時期較早，現在已達幼穗形成期，有幾個品種，包括「臺中六五號」等，都已完全枯死，甚至連對葉稻熱病抵抗性甚强的「臺中在來一號」，也受到了嚴重的損害。

又據各地農業改良場所辦理的稻熱病發生預測試驗調查結果，最近發現稻熱病病菌分生胞子產生數量日漸增多，田間稻熱病病斑也日見增加並擴展。

最近雖然久旱無雨，但如遇到陰天，氣溫在二十度至三十度之間，濕度又保持九十度左右，則該病很可能大發生。

尤其水稻在插秧後三十五至五十天分蘖盛期，或孕穗及齊穗等時期，最容易感染稻熱病，應特別注意防治。如果施用氮肥過多，稻葉過青，莖葉嫩弱，或栽培對稻熱病低抗性較弱的品種時，更須及早預防。

假如你有散粉器，可每分地撒佈「西藥生石灰」或「新美爾粉劑」三至四公斤，如有噴霧器，可噴射「利我農」乳劑一千二百五十倍，或「富米農」、「新美爾」、「武田滅爾」等片劑，每片加水六公升，每分地噴射稀釋液八百至一千二百公升。

在夾稻對於上列各種有機水銀劑很敏感，容易發生藥害，應儘量避免施藥。假使發生嚴重葉稻熱病時，勉强可將上項藥劑濃度減低一半應用，施藥後在稻葉上可能會產生褐色藥害小斑點，但對產量影響不大，可能比不防治會好一點。

「防病」重於「治病」依照目前的情形，本期作稻熱很可能會大發生，希望農友們及早預防，避免損害。

今年可能大發生


美國羅門哈斯公司 在意大利附屬機構

飛利多化學工廠出品

第一批 現貨已到

可利生

有效成份與美國製相同，但懸浮率較高，便於在森潛使用。



登記証一七五號　一公斤原裝

可利生、爲防治各種農作物 白粉病 特效藥、兼能殺除 紅蛛蜘

使用濃度：一千倍至二千倍

台灣總代理

青象貿易有限公司

台北市中正路1756號二樓　電話三六一七七

說明書附郵八角即寄。