



白鳳豆三月播種為宜

【問】：一、東部海拔八百公尺處，在去年八月所種的白鳳豆已八個月尚未結實，而且正月起落葉，現在又吐葉，原因何在？

【答】：一、白鳳豆開花和日照有關，三月播種為宜，今年當可採收。收穫期約四、五個月，但在高冷地可能稍有差異。

二、四月中旬種十石和胡麻都可以，但在開花和成熟期雨量不可太多，當時每月的雨量在一百公厘以下為宜。（王進生）

改良四真蘿蔔適於九月播種

【問】：五月中旬種的蘿蔔何品種比較適合？新育成的五峰早生和改良四真適合嗎？（嘉義縣新港鄉月眉村五十一號林益合）

【答】：一、適於五月中旬播種的蘿蔔品種有「四十天馬耳」、「長代仔」和「大白代」。

二、五峰早生種適於八、九月播種，改良四真適於九至十二月播種。（王進生）

三季甘藍宜在七月播種

【問】：一、清明包心白菜和三季甘藍在四月上旬可以播種栽培嗎？

二、六、七月栽培的甘藍以何品種為宜？（新營鎮嘉芳里八十二號周財寶）

【答】：一、清明包心是黑葉卷心白，四月上旬可播種，五月中下旬收穫，但管理必須周到，不然成功率就低。三季甘藍四月上旬播種，六月下旬可以採收，但產量不高，改為七月播種為宜，如果改為三月播種四月上旬收穫的產量較高。

二、適於六、七月播種的甘藍品種是本地早生，ニユートツ和坂田中早生為宜。（王進生）

柚樹下種包心白菜不理想

【問】：一、四年生的文旦柚遮蔭已佔二分之一的土地，夏季在柚樹下栽培極早生甘藍和包心白菜適合嗎？如果適合要選那品種較好？

二、遮蔭處會影響結球嗎？（臺南縣善化鎮六德里二三〇號王阿慶）

【答】：一、文旦柚的樹蔭下如果一天之中遮蔭五小時以上，蔬菜的生育就差，因甘藍和包心白菜不耐熱，光合作用不修生育不好，遮蔭雖不影響結球但緊密度差。

二、早生甘藍在六、七月播種，包心白菜約在七月播種為宜。

三、早生甘藍的優良品種以本地早生、ニユートツ和坂田中早生，包心白菜以黑葉卷心白和ハユミドリ等為佳。（王進生）

西印度櫻桃用高壓法繁殖

【問】：西印度櫻桃怎樣繁殖？（高雄市左營區合翠里一三四號張璇）

【答】：一、西印度櫻桃在嘉義農業試驗分所是用空中壓條法，和荔枝相同，但所取枝條可較小，祇需鉛筆桿大小就可以。

二、壓條時期最好是三、四月，約經三個月就可以剪來種植。

三、西印度櫻桃雖然也可用扦插繁殖，但需用植物生長素處理，並需在密閉溫室中管理，才可得滿意的結果。（張振甫）

阿公店今年八月供應魚苗

【問】：一、今年度臺南阿公店繁殖的草魚苗和鯉魚苗現在有無出售？價格如何？（花蓮縣吉安鄉南華村蕭家發）

【答】：一、臺灣省水產試驗所臺南分所由農復會資助，在阿公店水庫增加設備，正積極準備辦理草、鯉魚苗人工孵化。估計七、八月間始能有魚苗出售，到時當可同該所洽購。（農復會漁業組）



農藥成份標準 保證品質優良

- | | | |
|-------------|-----------------|---------|
| 臺北·新隆藥行發行 | 臺北市迪化街一段249號 | 電話46703 |
| 桃園·豐年農藥行 | 桃園縣中興鎮民權路35號 | 電話321 |
| 新竹·新竹市果菜合作社 | 新竹市西大路105號 | 電話425 |
| 苗栗·忠厚行 | 苗栗縣竹南鎮八德街45號 | |
| 南投·泰生保客堂 | 南投縣南投鎮民族路113號 | 電話222 |
| 臺中·德豐行 | 臺中市向上路一段2號之5 | 電話6227 |
| 彰化·美豐行 | 臺中市興中街13號 | 電話4394 |
| 雲林·德榮行 | 臺中縣霧峰鄉中正路327號 | 電話694 |
| 嘉義·年豐農藥行 | 嘉義市民生路166號 | 電話401 |
| 臺南·蓬萊農藥發行 | 臺南縣虎尾鎮光復路46號之1 | 電話863 |
| 高雄·廣源行 | 高雄縣旗山鎮六佳村三鄰109號 | 電話24 |
| 花蓮·蓬萊農藥發行 | 臺南市公園路178號 | 電話3197 |
| 花蓮·廣源行 | 花蓮市林森一路150號 | 電話22419 |
| 花蓮·廣源行 | 花蓮市中正路82號 | 電話990 |



中農化工廠股份有限公司出品

總公司：台北市南陽街廿一號 電話：三一六六〇
工廠：台北縣景美鎮中正路三一七號

巴拉松乳劑
P M 乳劑
馬拉松乳劑
安特靈乳劑
地特靈乳劑
DDT 乳劑
魚藤精乳劑
利我農乳劑



現貨供應