

豬的水腫病

豬的水腫病，亦稱腸毒症、腸水腫、或胃水腫。病狀不容易發發現，必須細心的觀察，發病後還沒有很理想的藥物可以治療，但可試用「阿那明」經耳靜脈注射，併用「康必安」肌肉注射，可以防止發生併發症。

走路不正常・痙攣和抽搐

水腫病是急性的毒血症，病狀不容易被發現，尤其是突然發生的在開始時，更難辨別，所以要想早期發覺的話，必須在臨牀診斷時細心的觀察，如食慾稍有減少，步法軟弱，搖動不定而不正常等。有些患病豬隻，盲目的行走，或打圓圈；急性的漸漸發生痙攣，一般都有肌肉痙攣的症狀，中樞神經常發生抽搐，患病豬常伏臥在地上，因為腿部不能運動或發生間斷的步行，如果發生了這些嚴重症狀後，很少有恢復的可能。

有時發高燒・下痢或便秘

一般情形下並不會增高體溫，但也有些病豬的體溫可昇高到華氏一百零四到一百零五度，並且有下痢或便秘的現象。但是因為病豬個體不同，所發生的病狀亦不一定。在豬瘟流行的區域，這種病不容易防止，急性的病程經過迅速，死亡率也同樣增高，一般病程經過的時間，祇有四十八小時，亦有因個體的不同，經過的時間稍長，能延長約五至七天。


肺部會水腫・胃充滿物體

解剖病畜所發現的病變，變異很大，一般以水腫和出血病變同時發生的較多。解剖時，主要是能見到胃壁粘膜炎、大腸的腸系膜間、眼瞼、耳部、面部，以及頰部等皮下組織有水腫的現象。但有時也不一定見得到，除非在病變後經詳細檢查的，一定可以發現腹水增加、腸間膜或肝漿液膜面附着細小的纖維素絲、心臟液增量和有拆出纖維素等現象。此外各局部淋巴腺呈高度腫脹、水腫、周邊性出血或出血灶內可見到壞死灶。肺部必然會發生水腫、充血，剖面有多量泡沫流出漿液；迴腸粘膜炎高度出血，呈糜爛狀；腸內有時赤褐色，聲帶或呈水腫。尤其值得注意的是胃裏一定充滿內容物，這也是本病的一大特徵。

注射阿那明・併用康必安

本病在未明瞭確實原因之前，治療方法都不很理想，依據筆者對本病治療的經驗，曾試用一種抗Histamin劑的阿那明(Allermin)經耳靜脈注射二十五公絲(mg)五支，每支為五ml的溶液，併用康必安(Combion)的肌肉注射，可以防止併發症的發生，效果還算良好，但重症的不治率仍舊相當高。預防本病的發生，目前還沒有有效的預防疫苗可供注射，所以筆者認為仔豬在實施豬瘟疫苗預防注射時，應在離乳前兩週左右施行，可以避免環境突然改變，似乎有預防本病發生的可能性，同時也已經有過實際的例子了。

熱天衛生愛認真！



龔君文
中禾圖

熱天環境起
到境居請
衛生上第
謹要講
快認原
，真緊因

傳染來防
霍亂去預
的蚊射注
病甲吃防
菌戶身起
，神着
，(蠅蒼)緊

看見嘴一
瓜乾滿破
那(渴)尿
津吃(肚)線
(涎垂)吃黑
(待及不迫)緊
(，(暈頭)眼暗黑