


# 米濃錠

銷行全省  
無遠不屆

請農友購藥時  
指明要防治稻  
熱病效果最佳之



臺灣總經銷：永興貿易行

本行：彰化市中正路363號 電話：51151075  
辦事處：臺北市南京西路36號二樓 電話：48076

## 米賜多愛

**METASYSTOX I**

紅蜘蛛·蚜蟲特效藥  
原裝：1000CC, 250CC 鋁瓶

多 穗

**TUZET**

水稻紋枯病特效藥  
原裝：1Kg, 250g 方鐵罐

拜耳銅粉

(氧氯化銅水懸劑)

**CUPRAVIT ob21**

最新全能低毒性殺菌劑  
原裝：1Kg 方鐵罐

臺灣總代理：中德貿易有限公司

進口商：東益貿易股份有限公司

臺北市天水路二號之四 電話：四三八〇二

現貨供應：建南農藥行

嘉義市中山路四四四號 電話：二一九八



請認明拜耳商標是

品質高超信用可靠之標記

## 地山的低太拔海 梨本日培栽要不

本省梨子品種，目前約有三十種，其中，以新世紀、二十世紀、長十郎、巴黎等品質較佳。

梨子施肥，早熟種二次，晚熟種三次。有機肥料和化學肥料並重，施用量因樹齡和植株發育情形，土質等而異。每株標準施肥量大致如下：

氮素：二年生五十公分，五年生一百二十五公分，十年生三百公分，十五年生三百五十公分，二十年生四百公分。

磷鉀：二年生五十公分，五年生一百二十五公分，十年生三百六十公分，十五年生四百二十公分，二十年生四百八十公分。

鉀質：二年生五十公分，五年生一百二十五公分，十年生三百六十公分，十五年生四百二十公分，二十年生四百八十公分。

第一次施肥着重有機肥，第二次用化學肥料或液肥。

梨樹開花時，早晨有濃霧，也不致影響結果。花期經常降雨，才會影響結果。

適當施肥、修剪，嚴格疏去過多果實，則每年均可結果。但在海拔低的地方，冬季某一年遇暖，則可影響次年結果。

梨樹秋季開花，是因栽培地方海拔過低。可用藥劑噴射，以增加春季開花率。

今年梨樹開花少，是因為去年秋季溫度高，大部花芽開放，又因冬季溫暖，第二次發生的枝未能形成花芽。海拔太低的山地，不能栽培日本優良品種，如果栽培橫山梨，可能好些。

梨子幼果發生黑星病，可在將發芽時噴一次「好速殺」。濃度是一公升水加〇·二二五公克藥劑。花苞時再噴一次。九〇%花瓣落後再噴一次。花瓣脫落後再兩週再噴一次。這樣即可完全防止。

## 瓊麻

栽培瓊麻的土地，以排水良好，富有石灰質者為適宜。土質不宜太酸，鹽分不可超過一·五%。

瓊麻每公頃宜種五千株，行距二公尺，株距一公尺；或行距二·五公尺，株距〇·八公尺，宜在春季或雨季開始前栽植。瓊麻苗在恆春區有售，苗價每株約三至四角，普通栽種後二年即可開始收穫採織。

瓊麻栽種四年後，在正常情形下，多可逐漸進入盛產期，每二年可收三次，平均每年每公頃可收一千五百至二千五百公斤。目前每公頃市價為十元左右，近年來國際市場暢銷，省產瓊麻除自給外，原料及成品均可暢銷國外，尚無滯銷現象。(季景元)

市價  
每斤  
十元  
左右