

怎樣使——

火雞不「賴抱」？

· 李登元 ·

母火雞賴抱，不但減低生產效能，而且增加管理上的麻煩，這裏有很多方法，可以使它不賴抱。

賴抱雖遺傳

仍舊可改正

發生賴抱的原因，是因為遺傳的關係，我們可以用選擇育種的方法來設法避免，但這需要很長的時間，好在即使是有遺傳性，我們仍舊可以在環境和管理方面來改變它。

在管理上制止火雞賴抱的方法，應使火雞的產卵箱空氣流通，不要過於溫暖而光線可以射入的為宜。不管產蛋箱裏有沒有蛋，不要讓母火雞坐在蛋箱裏三小時以上。我們要按時收集種蛋。且在夜間把產蛋箱隔起來。

下面是飼養大羣母火雞，使它不賴抱的幾個方法，可以參考使用：

常常換地方

時時照強光

準備四個沒有產蛋箱設備的空間，把賴抱火雞每天換放一間，然後趕入產蛋雞舍。

這種制止的方法，以空間有鐵絲網底的效果比較好。但在進行選出賴抱雞時，應在肛門處摸摸看，是否有蛋？如果有的話，要等它產下後再取出來。

把產蛋雞分為兩羣，分別飼養一處，每週

或兩週互相換一個地方來飼養，這方法也可以和第一種方法合併定期施行。

把賴抱火雞放入有強光的雞舍內二十四小時，制止它繼續賴抱，這種方法的效果很好。如有鐵絲網底的雞舍的效果則更好。因為這種方法不但可以減少使用面積而且也省工夫。

光源要普遍

飼料要不斷

至於應用二十四小時強光的方法，要注意下面四點：

一、每二十四平方英尺的地面，用一個一百五十瓦特的燈泡，並且裝置反光罩。


二、光源離墊草上的高度是四又二分之一英尺，使室內每一個角落都明亮。燈泡的外面必要時可以裝上鐵絲網，避免被火雞損壞。

三、經常要供應飲水和飼料。

四、當火雞經二十四小時強光照射之後，回到產蛋雞舍時，至少仍舊應該讓一般的光線，照射半小時。

總之，要使母火雞不賴抱，用選擇育種的方法來改善，時間要很長。從管理方面來控制，效果比較快。祇要照顧週到，便不致於減產。

少女不可愛虛榮！




宣懷文
小願圖

燈紅探拆
酒美拆
綠舞如
是甲如
舞舞好
（和）

警不局那
查有時不
影知着照牌無
女家良一個
（麼什做）？暗沖來在款這

市阿周姓女少
女舞名門出到
唐入歹騙查局警
去唐羅子騙吸流

火雞種蛋 小心處理



火雞種蛋孵化率的高低，和種蛋的處理關係很大。最好要做到下列各點：

鋪草·多收·保溫·通風

產蛋箱要鋪上三至四寸厚的墊草，墊草的種類不拘，通常用切斷的稻草即可。

每天收集種蛋的次數至少四次，這樣可以減少雞蛋染污的機會，在冷天或熱天收集種蛋更要勤快些。

收集的種蛋應儘速存放在通風的鐵絲網籃中，移到貯蛋室內使它冷卻，放置種蛋時最好使蛋的大頭向上。

貯蛋室的溫度要維持華氏五十至六十度，因為種蛋在冷凍或在華氏七十五度以上時，孵化率會降低。

保濕·洗擦·快孵·轉蛋

濕度方面應保持相關濕度約百分之八十。必要時在貯蛋室內放一盤水，用電風扇吹動水的表面，來維持上述的濕度。

火雞蛋如果能貯放在地下室的效果比較好，因為在地下室可以維持穩定而適當的溫度和濕度。

如果種蛋有清潔的必要時，最好的方法是用乾淨的砂紙或硬鬃刷，拭擦或刷去蛋表面的污物。種蛋實在太髒非洗不可時，應將蛋浸在華氏一百另五度含有清潔劑的溫水中，使它容易除去污物，污物除去後再用溫水洗淨待乾應用。

存放的種蛋以每星期孵化兩次的結果最好。若貯存在一星期以上孵化的，每天要把蛋轉一次，可以預防蛋黃的位置改變而影響孵化率。(李登元)

上圖前面的是美國貝茨維爾小型白火雞，後面的是青銅色火雞，關於白火雞的來源和特性，本刊在十四卷第八期已介紹過。抓着火雞的是前文作者簡明龍先生。(鮑國琛攝)



一萬女立
兒報人脫
出門警的
查查束的
走透透
頭從喜



勤奉
家有教
多子好
小兒道
心要理
緊要任
任責



少虛讀書
女做學
大心好
愛理事
注可不
意無女