

農友新知

撲滅森林火災 磷酸銨很實用

美國的科學家們發現，磷酸銨可以用來撲滅森林火災；以往，磷酸銨只用做肥料。

在美國，已有多次森林火災，用磷酸銨有效地撲滅。

應用磷酸銨撲滅森林火災頗為方便，在使用前泡成水溶液，裝入飛機的噴霧桶中，從空中噴射。磷酸銨比其他滅火劑便宜，同時具有肥料的效果，這也是它的好處。(IFC)

灌施塑膠泡沫 改良貧瘠土壤

貧瘠的土壤，可藉注入一種含有土壤養料的人造塑膠泡沫而改良。這種塑膠泡沫，將在地下形成剛固的結構組織，可以保存水份和肥料，並且在地表上造成一層酵素腐植土層。這產品為西德所發明。(朱捷譯自「大眾機械」)

生產適合外銷洋蔥 栽植距離應予縮小

臺灣洋蔥雖已栽培多年，且已大量外銷，但在栽植距離(即株行距)上尚無適當標準可為依據。鳳山園藝試驗所為生產適合外銷的洋蔥，除了改進品種、施肥、灌溉等工作之外，並從事精密栽植球形大小適中，整齊一致，農民收益增加的試驗。

根據以黃玉品種於十月中旬在鳳山地區播種的試驗結果，目前外銷洋蔥行距以十八至二十公分，株距以八至九公分最為適宜。

但是在十月下旬以後播種過晚或直播時，可以密植到十五×六公分。又如早玉、聖玉品種，因葉

部較大，行距似不宜小於二十公分；楊玉葉部較小，行距可以小到十五公分，株距可以小到六至八公分。

一般農家如無密植經驗，應逐漸試行縮小植距而不宜遽行高度密植。(林昭雄、郝宗雄)

化學藥劑阻止產卵 有效防治多種害蟲

美國農部最近研究成功了一種稱為「育創」的節制昆蟲繁殖化學劑，他們說，這一種化學劑對大多數害蟲如墨西哥果蠅、蒼蠅、蚊子和白蟻等，可以藉阻止其產卵而達到生物節制的目的，效果在加瑪射線以上。

為了使用上的安全，這種化學劑不能像一般殺蟲藥一樣的噴洒，而只能當做一種誘餌來吸引昆蟲，達到滅絕的目的。(朱捷譯自「新聞週刊」)


暖地水稻追肥穴施法

日本元岡縣農業試驗場研究暖地水稻追肥施用方法，以穴施法最為理想。方法是在稻株旁五至六公分的地方開掘直徑三分公分，深四公分的洞穴(如左圖)，施放肥料。

經過二年的試驗結果，這種追肥方法(穴施法)，比慣行方法(撒施法)具有下列的優點：肥效緩慢，持久性長；有效莖數增加，稈實良好，產量提高，「秋落田」不需施用「穗肥」，水稻生育健全，對胡麻葉枯病抵抗力增加。

這種施肥方法又很安全，不會有過肥之害，並可利用機械施肥，節省時間和勞力。

(立)取材自「農業及園藝」



水稻追肥穴施法

思登卅四 殺草劑 (登記證二七七號)

豐年第十四卷第六期第十頁稱：據臺中改良場試驗：揮秧時如水稻三葉，混植稗草二支則減產六七·六%。混植稗草一支則減產五·四%。水田二支，混植稗草二支，五十天後拔除稗草則比二十天後拔除稗草產量減少六六·七%。由此可證明：稗草愈多，除稗愈遲，收量愈減。因此在水稻秧田期和本田期發現稗草時，應立刻拔除。尤其是秧田期，在秧苗新葉伸長二至三葉時，就應該實施拔除稗草工作，愈早愈好。

思登卅四 (STAMER) 殺草劑可殺死稗草，對水稻無藥害。在秧田中水稻與稗草雜加分別，用思登卅四殺草劑人工除稗草尤為便利。

用 量：秧田—每分地七百CC加水六十至八十公升。本田—每分地九百五十CC加水六十至八十公升。

使用方法：稗草在二至三葉時，將水田排水，等稗草葉面乾燥時，用加壓式噴霧機全面噴藥。噴藥後一天，即灌水，以防止稗草的發芽衍生。噴藥時之氣溫最好加在攝氏二十度以上。稀釋藥液時先加思登卅四使用量半量，然後再加水稀釋使用拌後使其乳化，然後再加水稀釋使用。

適用作物：水稻、陸稻、馬鈴薯、高麗草、甘蔗等。

思登卅四可殺除：稗草、馬唐、藜、蔞、繁縷、父子草、狗尾草、牛頓懸、紅腳草、無頭肚香、知母草、烏古菜、狗屎菜、黑李仔菜等。

注意事項：不要與各種農藥混合使用，噴撒思登卅四前後各一星期內，亦不要噴撒各種農藥，以免發生藥害。

現貨供應處：正豐公司 臺中縣霧峰鄉草湖路一號

臺灣總代理：青象貿易有限公司

臺北市中正路一七五號三樓

電話：三六一七七

函索農藥說明書附郵票八角即寄