

曲農信箱

水稻施肥時間要適當

【問】：一、水稻施肥何時最適當？
二、據說在來稻的產量可以高於蓬萊稻是否確實？（臺東縣卑南鄉大南村東園十四號之五黃英吉）

【答】：一、水稻施肥要注意後期生育情形，如葉色仍保持濃綠不可施用，如至淺綠始可施用，施用適期最要緊，應在抽穗前約廿天，最好用刀片切開母葉檢查，它的幼穗（棉仔心）形成一二粒米粒長時施用最適宜，過早或過晚效果較小。
二、在來稻的產量高於蓬萊稻，是因為土質和栽培管理不同的關係，如果在同一坵田裏種植比較，在來稻的產量不會高於蓬萊稻。不過現在推廣的臺中在來一號，植株低，能耐肥，產量很高。（楊方平）

尿素混合中性農藥噴用

【問】：一、尿素肥料可以和一般農藥混合使用嗎？
二、用地特靈藥劑噴射柑桔的幹部有無影響？

三、地特靈可噴射柑桔莖部或葉面嗎？
（新竹縣新埔鎮清水里一三二號鍾昇宏）

【答】：一、尿素是中性肥料，葉面施肥時，可以和中性農藥混合使用，在柑桔上可用百分之五至百分之十即稀釋二百至一百倍，新植柑桔不可超過百分之五，否則老葉有凋落現象。
二、地特靈殺蟲劑濃度百分之五噴射柑桔幹部經歷年來尚未發現不良影響，諒不會有碍柑桔的生長。

三、地特靈殺蟲劑，對於柑桔枝葉的害蟲不但效力差，而且因為有殘毒性，會殺死許多益蟲，對於噴藥的人也有危險，所以不可噴在枝葉上。（張良傳）

梨樹施肥視樹齡不同

【問】：梨樹何時施肥？對於七、九年生梨樹施氮、磷、鉀肥各多少？（新竹縣新埔鎮大坪林折捨）

龍眼紅蜘蛛為害噴夏油

【問】：龍眼被紅蜘蛛為害，如何防治？（花蓮縣吉安鄉南華源卅七號翁宗榮）

【答】：一、紅蜘蛛為害可以噴射百分之九十五「高級夏油」七十二倍。
二、「盛加津」四百倍或「滅地悉死脫愛」一千倍，或「克氣茶」一千倍，或「鐵地旺」五百至一千倍，或「開路生」五百倍稀釋液一次。（朱啓魯）

【問】：請開芳樟種子和苗木何處有售？價格多少？（臺南縣新市鄉社內村五十六號吳連生）

【答】：一、芳樟種籽以花蓮、玉里最多，林務局所屬有關林區如有需要都委託玉里林區代採，或本費每公升六十元可直接委託玉里林區代採。
二、芳樟種籽大都不純，因林地內各種樟樹參雜，在開花結籽時花粉自



巴拉松乳劑，大減速乳劑
馬拉松乳劑，立農松乳劑
PM 乳劑，PB 乳劑
蔬菜乳劑，展着劑
石灰硫磺合劑
DDVP 乳劑
安特靈乳劑



立農化學工業股份有限公司

地址：臺北市太原路57號3樓
電話：41108 41246
工廠：臺北縣士林鎮崗華里32號之3

員林：美豐農藥行 何阿麻 員林鎮中正路192號
電話：員林779
嘉義縣義竹鄉六桂村199號
電話：義竹局24號
屏東市民生路194號
電話：357號轉

經銷處：

宜蘭：葉宜興行	葉英傑	宜蘭市渭水路92號
電話：47		
臺中：臺中聯絡處	江振通	雅鄉民生路67號
萬有西藥房	張紹銓	臺中縣大原鎮市前街101號
南投：輝豐行	張錫農	臺中縣豐原485
		南投鎮中山街125號
		電話：南投135