



蠶豆銹病防治法

【問】：請問蠶豆銹病，如何防治？（花蓮市建國路六十二號楊獻章）

【答】：蠶豆銹病防治法：用無病的豆莢採種，已發生病害要燒掉，在發病初期用六六式石灰波爾多液撒布。（朱啓魯）

種甜椒避免輪作乾燥和高溫

壞？

【問】：一、甜椒適於栽培在那樣的土壤？

二、甜椒在結果中，有會立着死去的那是什麼病？有何方法防治？

三、如何預防甜椒的落果？（宜蘭縣蘇澳鎮南強里大通路四九號黃仁和）

【答】：一、甜椒最適宜於排水良好的砂質壤土。

二、甜椒立着死去的大都是青枯病，排水不良的土壤容易發生。防治法：不要和茄子、馬鈴薯、番茄、菜豆、大豆、花生、蘿蔔等作物輪作。土壤害蟲的驅除也可減少發病，其他無藥劑可以預防。

三、防止甜椒的落果方法要選免土壤乾燥為上策，次之受高濕的影響（攝氏三十五度）而致落果，所以夏季應在海拔五百公尺以上的場地栽培。（王進生）

種木耳最低溫十二度

【問】：本人想要種木耳為副業，却發生了問題：一、最低溫度是多少？

二、菌絲發到什麼程度可以下種？

三、下種後要怎樣管理？（嘉義縣梅山鄉瑞峰村賴坤豐）

【答】：一、木耳生長的最低溫度是攝氏十二度。

二、菌絲發育到瓶底後就可以下種。

三、下種後初期保持溫度在百分之六十五，和攝氏二十六度左右的溫度下，使菌絲充分發育，生長良好以後移至百分之八十五的溫度下使它發生木耳。（胡開仁）

每箱蜜蜂限一個蜂王

【問】：一、蜂巢是用何物做成的？

二、蜂巢內的蜂蜜要到如何程度時才可採取？

三、要如何才能防止被蜜蜂刺到？

四、蜜蜂在什麼時候才開始分封？

五、要如何繁殖蜜蜂？

六、分封時要怎樣才不致使蜜蜂飛走？

七、本刊以前說過要把蜂王除去，除去了蜂王，子蜂就會全部死亡或飛失，怎能除去蜂王？（苗栗縣卓蘭鎮西坪里一百廿二號陳忠雄）

【答】：一、蜂巢是蜜蜂的職蜂吸食蜂蜜後，由腹部腹面上蠟板分泌的蜂蠟。然後和唾液混和所成的蜂蠟就可以建造蜂巢。

二、蜂巢如達一萬五千隻以上，即有七足框職蜂，如野外有大蜜源，就可以採蜜。

三、如為防止蜜蜂盜窠，最好頭部加用紗網罩即可避免。

四、蜜蜂通常在春季野外蜜源較多，而蜂巢旺盛時就要開始分封。

五、最好在早春開始飼餵，可以促進提早繁殖。

六、當蜂王開始分封時，即應注意隨時檢查蜂王和子蜂的產生情形，如發現蜂王，就要計算王臺中蜂王可於何時羽化？為防止分封，最好每箱內僅留一隻王臺，多餘的除去或另外分箱，則蜂王產力衰退，可在分封季節把蜂王除去，則蜂王可於一天後開始建造新王臺而不致於死亡或逃失。（林廷瑞）



任何鷄都可做童子雞

【問】：一、繁殖童子雞以何品種雜交為佳？

二、何處可買純種童子雞？價格若干？

三、何處可以買到開鷄的器具？

【答】：一、



農藥成份標準 保證品質優良

- 臺北 新蓬萊農產行 臺北市迪化街一段249號 電話46732
- 桃園 豐年農產行 桃園縣中壢鎮民權路35號 電話321
- 新竹 新竹青果運銷合作社 新竹西大路105號 電話1425
- 苗栗 惠 亞 行 苗栗縣竹南鎮八德街45號
- 南投 泰生保畜堂 南投縣南投鎮民族路113號 電話22轉
- 臺中 進 豐 行 臺中市向上路一段2號之5 電話6227
- 生光農藥行 臺中市興中街13號 電話4984
- 彰化 美 豐 行 臺中縣勝峰鄉中正路327號 電話63轉
- 德 榮 行 彰化市民生路166號 電話401
- 雲林 惠 豐 行 雲林縣虎尾鎮光復路45號之1 電話393
- 嘉義 年登農藥行 嘉義縣義竹鄉六桂村三部199號 電話24
- 臺南 蓬萊農業資材行 臺南市公園路178號 電話3497轉
- 高雄澎湖 富農種苗行 高雄市林森一路150號 電話22449
- 花蓮臺東 邱協成農藥行 花蓮中正路路6號 電話990轉

巴拉松乳劑
P M 乳劑
馬拉松乳劑
安特靈乳劑
地特靈乳劑
DDT 乳劑
魚藤精乳劑
利我農乳劑

中農化工廠股份有限公司出品

現貨供應

總公司：台北南陽街廿一號 電話：三一六六〇
工廠：台北縣景美鎮中正路三一七號